

Сорт має високу посухостійкість та зимостійкість, середню стійкість до осипання та полягання. Вегетаційний період – 140 днів. Залистяність 56,8%. Зберігається в травостої 5-8 років і більше. Вміст білку 20,9%, клітковини - 21,5%. Сорт швидко відростає навесні, після скошування та випасання на другий і наступні роки користування, стійкий до витравлювання худобою, невибагливий до ґрунтів, здатний витримувати досить тривалі затоплювання та кислотність. Однак високі врожаї можна одержувати, в основному, на слабо кислих ґрунтах або після вапнування. Добрі врожаї бувають на всіх основних типах не чорноземів, в тому числі глинистих ґрунтах. Середня урожайність сухої речовини становить 85,0 ц/га, насіння – 1,4 ц/га.

Напрям використання – пасовищний.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

Динамо. Оригінатор - Інститут сільського господарства Полісся УААН, Інститут кормів УААН.

Метод виведення: Масовий відбір із місцевої популяції.

Ознаки сорту: Габітур напівпрямостоячий. Довжина рослини - середня. Забарвлення листка - світло-зелене, довжина центрального листочка - від середнього до довгого, ширина - від середнього до широкого. Початок цвітіння - від раннього до середнього. Квітка: частота рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками - відсутня або дуже мала; частота рослин зі строкатими квітками - відсутня або дуже мала; частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками - дуже висока. Довжина стебла (найдовше стебло разом з китицею при повному цвітінні) - середня. Натуральна висота, коли ранній сорт досягає періоду появи квіткових бруньок після першого зрізу, другого і третього – середня. Стійкість до вертиціліозного вільту – *Verticillium albo-atrum Resistance to Verticillium albo-atrum* - дуже висока. Залистяність - 38-53%. Зимостійкий та посухостійкий. Має середню стійкість до полягання та осипання. Ураження хворобами - незначне.

Середня урожайність сухої речовини становить 77,2 ц/га, максимальна – 84,0 ц/га, насіння – 3,9 ц/га.

Сорт відрізняється від подібного сорту Лотос - середньостиглістю, світло-зеленим кольором.

Напрям використання – лукопасовищний.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

Люпин жовтий

Обрій. Оригінатор - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: при внутрівидовій гібридизації методом рекомбіногенезу фузаріозо-стійкого мутанта 798 з сортом Промінь.

Ознаки сорту: Рослина висока, прямостояча через три тижні після появи сходів. В стадії бутонізації листки світло-зеленого кольору, стебло з середнім антоціановим забарвленням, високе. Верхівковий листок довгий, широкий. Квітки хромово-жовтого кольору, кінчик човника – синьо-чорний. Біб середньої довжини. Зерно в повній стиглості - сіре. Маса 1000 насінин 125-130 г. Сорт скоростиглий, після нього можна сіяти озимі культури, не вилягає, придатний для механізованого збирання, боби не розтріскуються, стійкий до весняних приморозків (-5°C), високостійкий до фузаріозного в'янення, толерантний до вірусів і антракнозу. Гірка речовина відсутня.