

0,8 см, опущення рідке, середня кількість насінин у бобі – 6 штук, максимальна – 9. Середня кількість бобів на рослині - 26, максимальна – 37. Насіння середньої величини, округле, світло-коричневого кольору без малюнку, гладеньке, матове; сім'ядолі рожеві; рубчик вузький, сірий. Маса 1000 насінин – 61 г. Від близьких за морфологічними ознаками сортів, сорт відрізняється більш світлим забарвленням насіння. Сорт середньостиглий (92 дні). Середня урожайність сухої речовини - 33,8 ц/га. Вміст білка - 18,7%, збір білка - 6,3 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Горошок (Вика озима)

Лебедина пісня. Оригінатор - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Метод виведення: багаторазовий масовий добір із других укосів зразка двохукісної озимої (вoloхatoї) вики, яка висівалася на несприятливих для зимівлі фонах з послідувочим перезапиленням кращих номерів.

Ознаки сорту: сходи зелені з рідким опущенням, має 6-8 пар листочків овально-продовгуватої форми, зелені, цільнокраї, у наявності двадцять вусика, кінчик листка тупий. Кущ розгалужений. Стебло зелене, рідко опущене, висотою 139-161 см, міжвузлі більше 20. Суцвіття – багатоквіткова китиця. Квітконос довгий, зелений, 21-34 і більше квіточок на квітконосі. Квітки великі, синьо-фіолетового кольору. Боб щільний, пергаментний шар сильний, шов тонкий, темно-коричневого кольору, без опущення, продовгувато-ромбічної форми із загостреним кінцем. Середня кількість бобів на рослині до 150. У бобі 3-4 насінин, максимально - 7-8.

Насіння середнє, округлої форми, чорне, темно-сіре, гладеньке, матове. Рубчик вузький, сірий, рідко світлий. Маса 1000 насінин – 35,4 г. Стійкий до несприятливих зовнішніх умов. Незначно уражається хворобами. Середньостиглий (вегетаційний період 300 днів). Вміст білка – 21,3%, клітковини – 24,9%. Середня урожайність сухої речовини – 78,0 ц/га, насіння – 20,2 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

Перлина. Оригінатор - Одеський державний аграрний університет.

Сорт відноситься до виду Панонська (*Vicia Pannonica* Crantz).

Форма рослин кущова. Стебло - 4-гранне, прямостояче, досить міцне. Висота рослин 90-110 см. Квітка –китиця (кисть) білого або кремового кольору. Пергаментний шар сильний. Кількість бобів на рослині в фазі повної стигlosti від 17 до 30. Число насіння в бобі 5-бішт. Насіння округле, вугловате або трохи сплюснуте, крупне. Маса 1000 насінин 36-40 г.

Сорт дворачка, факультативний самозапилювач (до 40%), ранньостиглий, вегетаційний період (до укісної стигlosti) – 219-227 діб.

Залистяність висока – 70-80%. Максимальний приріст надземної маси припадає на період від бутонізації до цвітіння. Сорт стійкий до посухи, вилягання, обсипання бобів та насіння. Шкідниками пошкоджується менш ніж інші сорти вики. Твердокам'яних насінин біля 2-3%. Дозрівання одночасне. Насіння збирають прямим комбайнуванням у звичайні роки за метеорологічними умовами.

Середня урожайність зеленої маси в суміші зі злаками сягає 600-700 ц/га з долею вики 60-70%, насіння – 9,5-13,0 ц/га.