

0,8 см, опущення рідке, середня кількість насінин у бобі – 6 штук, максимальна – 9. Середня кількість бобів на рослині - 26, максимальна – 37. Насіння середньої величини, округле, світло-коричневого кольору без малюнку, гладеньке, матове; сім'ядолі рожеві; рубчик вузький, сірий. Маса 1000 насінин – 61 г. Від близьких за морфологічними ознаками сортів, сорт відрізняється більш світлим забарвленням насіння. Сорт середньостиглий (92 дні). Середня урожайність сухої речовини - 33,8 ц/га. Вміст білка - 18,7%, збір білка - 6,3 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Горошок (Вика озима)

Лебедина пісня. Оригінатор - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Метод виведення: багаторазовий масовий добір із других укосів зразка двохукісної озимої (вoloхatoї) вики, яка висівалася на несприятливих для зимівлі фонах з послідувочим перезапиленням кращих номерів.

Ознаки сорту: сходи зелені з рідким опущенням, має 6-8 пар листочків овально-продовгуватої форми, зелені, цільнокраї, у наявності двадцять вусика, кінчик листка тупий. Кущ розгалужений. Стебло зелене, рідко опущене, висотою 139-161 см, міжвузлі більше 20. Суцвіття – багатоквіткова китиця. Квітконос довгий, зелений, 21-34 і більше квіточок на квітконосі. Квітки великі, синьо-фіолетового кольору. Боб щільний, пергаментний шар сильний, шов тонкий, темно-коричневого кольору, без опущення, продовгувато-ромбічної форми із загостреним кінцем. Середня кількість бобів на рослині до 150. У бобі 3-4 насінин, максимально - 7-8.

Насіння середнє, округлої форми, чорне, темно-сіре, гладеньке, матове. Рубчик вузький, сірий, рідко світлий. Маса 1000 насінин – 35,4 г. Стійкий до несприятливих зовнішніх умов. Незначно уражається хворобами. Середньостиглий (вегетаційний період 300 днів). Вміст білка – 21,3%, клітковини – 24,9%. Середня урожайність сухої речовини – 78,0 ц/га, насіння – 20,2 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

Перлина. Оригінатор - Одеський державний аграрний університет.

Сорт відноситься до виду Панонська (*Vicia Pannonica* Crantz).

Форма рослин кущова. Стебло - 4-гранне, прямостояче, досить міцне. Висота рослин 90-110 см. Квітка –китиця (кисть) білого або кремового кольору. Пергаментний шар сильний. Кількість бобів на рослині в фазі повної стигlosti від 17 до 30. Число насіння в бобі 5-бішт. Насіння округле, вугловате або трохи сплюснуте, крупне. Маса 1000 насінин 36-40 г.

Сорт дворачка, факультативний самозапилювач (до 40%), ранньостиглий, вегетаційний період (до укісної стигlosti) – 219-227 діб.

Залистяність висока – 70-80%. Максимальний приріст надземної маси припадає на період від бутонізації до цвітіння. Сорт стійкий до посухи, вилягання, обсипання бобів та насіння. Шкідниками пошкоджується менш ніж інші сорти вики. Твердокам'яних насінин біля 2-3%. Дозрівання одночасне. Насіння збирають прямим комбайнуванням у звичайні роки за метеорологічними умовами.

Середня урожайність зеленої маси в суміші зі злаками сягає 600-700 ц/га з долею вики 60-70%, насіння – 9,5-13,0 ц/га.

Сорт придатний для вирощування раннього зеленого корму (кінець квітня – весь травень), а також для сіна, сінажу, силосу (у суміші з тритикале).

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

Ячмінь озимий

Дністер. Оригінатор - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Метод виведення: індивідуальний добір в мутантній популяції.

Ознаки сорту: Габіус прямостоячий. Рослина - довга. Початок колосіння - ранній. Листові обгортки нижніх листків - опущені. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє; наліт на листовій обгортці- слабкий. Частота рослин з вигнутими прапорцевими листками - низька. Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків-наявне; інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків - середня; довжина відносно колосу – довгий. Колос: напівпрямий; наліт відсутній або дуже слабкий; рядів більше двох; форма циліндрична, нещільний; довгий. Стрижені колосу: довжина першого сегменту середня; вигин першого сегменту відсутній або дуже слабкий. Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зерна – довші. Зерно: тип волосків основної щетинки – короткі; плівка наявна; антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке; зубчики внутрішніх спинних жилок нижньої квіткової луски відсутні або дуже слабкі; опущення центральної борізди відсутнє. Зернівка: забарвлення алейронового шару світла, маса 1000 насінин 41,2 г. Сорт ранньостиглий. Висота рослин 135 см. Стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Висока зимостійкість. Ураженість хворобами незначна. Середня урожайність сухої речовини 89,1 ц/га, насіння – 31,2 ц/га. Вміст протеїну 9,7%.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

Тимофіївка лучна

Підгірнянка. Оригінатор – Передкарпатський філіал ІЗіТ західного регіону УААН.

Метод виведення: родинно-груповий добір рослин сорту Ленінградська 204 при вільному перезапиленні із сортом Люлінецька 1.

Диплоїд. Рослина: здатність утворення суцвіття в рік посіву – низька, габіус на другий рік – прямостійка, час появи суцвіття на другий рік – середній. Колір листка – зелений. Довжина та ширина прапорцевого листка (на середньому стеблі через 2 неділі після появи суцвіття) – середній. Довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – довге. Довжина повністю сформованого суцвіття – середня. Сорт високорослий – 120-150 см, сінокісно-пасовищного типу, зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Вміст білка -11,0%, клітковини – 31,8%. Середня урожайність сухої речовини ~ 64,5 ц/га, максимальна – 97,0 ц/га.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.