

Сорт придатний для вирощування раннього зеленого корму (кінець квітня – весь травень), а також для сіна, сінажу, силосу (у суміші з тритикале).

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

Ячмінь озимий

Дністер. Оригіна́тор - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Метод виведення: індивідуальний добір в мутантній популяції.

Ознаки сорту: Габітус прямостоячий. Рослина - довга. Початок колосіння - ранній. Листові обгортки нижніх листків - опушені. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє; наліт на листовій обгортці- слабкий. Частота рослин з вигнутими прапорцевими листками - низька. Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків-наявне; інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків - середня; довжина відносно колосу – довгий. Колос: напівпрямий; наліт відсутній або дуже слабкий; рядів більше двох; форма циліндрична, нещільний; довгий. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня; вигин першого сегменту відсутній або дуже слабкий. Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зерна – довші. Зерно: тип волосків основної щетинки – короткі; плівка наявна; антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке; зубчики внутрішніх спинних жилок нижньої квіткової луски відсутні або дуже слабкі; опушення вентральної боріздки відсутнє. Зернівка: забарвлення алейронового шару світла, маса 1000 насінин 41,2 г. Сорт ранньостиглий. Висота рослин 135 см. Стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Висока зимостійкість. Ураженість хворобами незначна. Середня урожайність сухої речовини 89,1 ц/га, насіння – 31,2 ц/га. Вміст протеїну 9,7%.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

Тимофіївка лучна

Підгірнянка. Оригіна́тор – Передкарпатський філіал ІЗіТ західного регіону УААН.

Метод виведення: родинно-груповий добір рослин сорту Ленінградська 204 при вільному перезапиленні із сортом Люлінецька 1.

Диплоїд. Рослина: здатність утворення суцвіття в рік посіву – низька, габітус на другий рік – прямостійка, час появи суцвіття на другий рік – середній. Колір листка – зелений. Довжина та ширина прапорцевого листка (на середньому стеблі через 2 тижні після появи суцвіття) – середній. Довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – довге. Довжина повністю сформованого суцвіття – середня. Сорт високорослий – 120-150 см, сінокісно-пасовищного типу, зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Вміст білка -11,0%, клітковини – 31,8%. Середня урожайність сухої речовини - 64,5 ц/га, максимальна – 97,0 ц/га.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.