

Стоколос безостий.

Полтавський 5. Оригінатор - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Метод виведення: перезапилення кращих по кормовій продуктивності клонів.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячої форми, середньої щільності. Стебло – прямостояче, середньої грубості, слабоопушене, округлої форми, темно-зелене, висотою 80-115 см, 6 міжвузля, має сильну кущистість. Залистяність до 70%. Листки довжиною 22-25 см, шириною 8-10 мм, лінійні, сизо-зеленого кольору, м'які, восковий наліт відсутній. Суцвіття: прямостояча розкидиста волоть, довжиною 15-30мм, середньої щільності, світло-зеленого кольору, мають 5-10 квіточок, киль тупий, колосові і квіткові луски ланцетні. Насіння: плоске, продовгувате, довжиною 8-12 мм, шириною 2 мм, темно-сірого кольору.

Вегетаційний період 108 днів. Маса 1000 насінин 3,8 г. Зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 75,9 ц/га, максимальна – 121,4 ц/га, насіння – 5,1 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 12,4%, клітковини – 26,8%.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

Всеслав. Оригінатор - Інститут кормів УААН.

Метод виведення: індивідуальний добір із гібридної популяції /К-35621 х К 39141/.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячої форми, не щільний. Стебло пряме, тонке, середньої грубості, опушення відсутнє, світло-зеленого кольору. Листки довгі, опушені, без воскового нальоту, м'які, лінійно-ланцетної форми, сіро-зеленого кольору. Кущистість сильна (27 стебел). Залистяність - 57%. Язичок короткий, розсічений, тупий. Суцвіття: розкидиста волоть, світло-зеленого кольору, безоста, довжиною 10-20 см. Колоски продовгувато-лінійні, блідо-зеленого кольору, 5-10 квіточок, киль 3-4 мм. Насіння темно-сіре, широко - ланцетне, 6-12 мм довжиною, 2,2-2,6 мм шириною, маса 1000 насінин 3,8 г.

Сорт скоростиглий, сінокісного типу, стійкий до вилягання, інтенсивно відростає рано на весні і після скошування. Середня урожайність сухої речовини – 64,5 ц/га, максимальна – 104,8ц/га, насіння – 6,3 ц/га. Вміст білка 12,4%, клітковини – 25,8%.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Степу.

Геліус. Оригінатор – Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий, не щільний, розкидистий. Стебло – пряме, гладеньке, не опушене, округлої форми, темно-зелене, висотою 120-135 см, має сильну кущистість. Залистяність до 62-68%. Листки довжиною 28-32 см, без опушення, світло-зеленого кольору, м'які. Язичок тупий, короткий, пливчатий, ледь надірваний, із зубчатими краями, крайні зубчики видовжені.

Суцвіття: розкидиста волоть довжиною до 25 см, середньої щільності, сірувато-зеленого кольору, без остюків. Колоски довжиною 2-6 см, шириною до 0,6 см, по 6-8 квіточок. Насіння: плоске, продовгувате, сірувато-соло'яного кольору. Маса 1000 насінин 3,2 г.

Сорт середньостиглий, зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 74,9 ц/га, максимальна – 107,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 10,5%, клітковини – 31,3%.
Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та на зрошенні Степу.

Топаз. Оригіатор – Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий, високорослий, компактний, середньої щільності. Стебло – пряме, гладеньке, ніжне, не опушене, висотою – 140-155 см. Вузли темно-зеленого кольору. Кущистість середня. Залистяність 65-67%. Листки темно-зеленого кольору, без опушення, без воскового нальоту, м'які, трохи шороховаті. Язичок тупий, короткий, плівчастий, ледь надірваний із зубчастими краями, крайні зубці злегка закруглені (це і є відмінність сорту). Суцвіття – розкидиста волоть довжиною до 28 см, середньої щільності, бузково-зеленого кольору, без остюків. У колоску 6-8 квіточок. Насіння плоске, продовгувате, темно-фіолетового – сірого кольору.
Сорт стійкий до посухи, полягання, зимостійкий. Днів до першого укусу – 76-85 днів. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 73,4 ц/га, максимальна – 96,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 13,4%, клітковини – 30,5%.
Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

Скіф. Інститут тваринництва степових районів ім. М. Іванова „Асканія Нова” УААН, Інститут кормів УААН.

Сорт створений індивідуально-груповим добром із місцевої популяції.

Ознаки сорту: Кущ напіврозлогий, рихлий. Стебло – ніжне, без опушення, висотою 140 см, вузли – зелені, 4-10 міжвузля. Кущистість сильна. Залистяність 60,8%. Листки темно-зеленого кольору, без опушення, без воскового нальоту, м'які. Язичок тупий, короткий, рихлий. Суцвіття – продовгувата спрямована косо вгору волоть, довжиною 12-18 см, середньої щільності, безоста, темно-зеленого кольору. Насіння сіре, широко ланцетне.

Сорт стійкий до посухи, полягання, зимостійкий. Днів до першого укусу – 68-75 днів. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 73,7 ц/га, максимальна – 86,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 14,6%, клітковини – 27,5%.
Сорт сінокісно-пасовищного напрямку використання, середньостиглий, дає три повноцінні укуси. Рекомендовано використовувати у зоні Степу.

Костриця лучна

Ліфара. Оригіатор - Дойче Заатфеределунг Ліпштадт- Бремен ГмбХ.

Ознаки сорту: Кущ напівпрямостоячий до середнього. Стебло - середнє до довгого. Листки зелені до темно-зеленого кольору. Час викидання суцвіття - середній. Прапорцевий листок короткий до середнього, вузький до середнього. Найдовше стебло середньої величини. Суцвіття середньої довжини. Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Має високу