

кущистість. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування становила – 54,5 ц/га, максимальна – 82,5 ц/га, насіння – 3,8 ц/га. Вміст білка 10,8%, клітковини – 28,9%. Ранньостиглий, сінокісно-пасовищного типу.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

Пажитниця багаторічна

Лета. Оригінатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Сорт виведений методом індивідуального групового відбору ранньостиглих форм з екологічно віддалених популяцій.

Ознаки сорту: Диплоїд. Габітус восени похилий. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву слабка. Час утворення суцвіття в рік посіву дуже пізній. Листки зелені. Габітус весною прямостоячий. Висота рослин весною - низька. Утворення суцвіття на другий рік – раннє. Прапорцевий листок середньої довжини, вузький. Довжина найменшого стебла включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані – середня. Довжина сформованого суцвіття - середня.

Сорт ранньостиглий, лукопасовищного напрямку використання. Середня урожайність сухої речовини – 67,6 ц/га, максимальна – 88,0 ц/га, насіння - 6,7 ц/га. За рік використання сорт дає 4-5 укосів. На одному місці сорт можна використовувати протягом 4-5 років. Зимостійкий, посухостійкий. Має середню стійкість до вилягання. Незначно уражується хворобами. Вміст білка 13,8%, клітковини – 26,5%.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

Андріана-80. Оригінатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Диплоїд. Габітус восени напівпрямостоячий. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву слабка. Листки зеленого кольору. Рослина середньої висоти. Довжина прапорцевого листка середня, ширина – вузький. Довжина найдовшого стебла та верхнього міжвузля – середня. Суцвіття: довжина (коли вони повністю сформовані) – середнє; кількість волосків (коли вони повністю розкриті) – середня. Час утворення суцвіття на другий рік - середній.

Сорт має густе трав'яне покриття, придатний для газонів загального призначення, дуже декоративний.

Середньостиглий, зимостійкий, стійкий до ураження хворобами. Залиштність -56,0%, висота рослин – 72 см. Середня урожайність сухої речовини -92,0 ц/га, насіння – 7,9 ц/га.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.