

Пажитниця багатоквіткова

Жайвір. Оригінатор - Інститут землеробства і біології тварин УААН.

Тетраплоїд. Габітус восени - прямостійкий. Має дуже сильну тенденцію формування суцвіття в рік посіву. Листок темно-зеленого кольору. Прапорцевий листок на початку цвітіння довгий, широкий. Довжина найвищого стебла з суцвіттям довга. Суцвіття дуже довге, має багато колосків.

Сорт відноситься до середньостиглої групи сортів. Середня урожайність сухої речовини 72,3 ц/га – максимальна - 152,0, насіння - 14,1 ц/га. Сорт дає два-три укоси у рік. Маса 1000 насінин 4,6 г. Зимостійкий, стійкий до вилягання та осипання. Незначно уражується хворобами. Якісні показники: вміст білка 11,3%, клітковини – 27,3%.

Рекомендовано використовувати у зоні Полісся.

Трапез. Оригінатор – Норддойче Планценхукт Ханс-Георг Лемке КГ.

Метод виведення: Поліクロс із сортів Керем х Феннема х СІ 5079, випробування, розмноження.

Ознаки сорту: Диплоїд. Габітус весни – проміжний, весною – середній. Тенденція утворення суцвіття на другий рік посіву - середня. Висота рослини весною – низька, на початку цвітіння – середня. Довжина та ширина прапорцевого листка – середній. Довжина найменшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – середній. Суцвіття: довжина (коли вони повністю сформовані) – середнє, кількість колосків (коли вони повністю розкриті) - середня.

Середньостиглий. Середня урожайність сухої речовини 51,4 ц/га, максимальна – 78 ц/га. Вміст білка 13,2%, клітковини – 30,6%.

Зимостійкий. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Незначно уражується хворобами.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Костриця очеретяна

Смерічка. Оригінатор - Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Метод виведення: масовий добір високопродуктивних рослин сорту Балтика при вільному перезапиленні з сортом Івано-Франківська місцева.

Ознаки сорту: Диплоїд. Колір листка восени в рік посіву – світло-зелений. Ширина листка восени в рік посіву – середня. Рослина восени в рік посіву напівстояча. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву відсутня або дуже слабка. Час появи суцвіття на другий рік посіву – середня. Висота рослин при появі суцвіття – висока. Довжина прапорцевого листка (на середньому стеблі через дві неділі після появи суцвіття) – середня, ширина – від середньої до широкої. Довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) - від середньої до довгої. Довжина суцвіття – від середньої до довгої. Сорт сінокісного напрямку використання.