

Пажитниця багатоквіткова

Жайвір. Оригіатор - Інститут землеробства і біології тварин УААН.

Тетраплоїд. Габітус восени - прямостійкий. Має дуже сильну тенденцію формування суцвіття в рік посіву. Листок темно-зеленого кольору. Прапорцевий листок на початку цвітіння довгий, широкий. Довжина найвищого стебла з суцвіттям довга. Суцвіття дуже довге, має багато колосків.

Сорт відноситься до середньостиглої групи сортів. Середня урожайність сухої речовини 72,3 ц/га – максимальна - 152,0, насіння - 14,1 ц/га. Сорт дає два-три укуси у рік. Маса 1000 насінин 4,6 г. Зимостійкий, стійкий до вилягання та осипання. Незначно уражується хворобами. Якісні показники: вміст білка 11,3%, клітковини – 27,3%.

Рекомендовано використовувати у зоні Полісся.

Трапез. Оригіатор – Норддойче Планценцухт Ханс-Георг Лемке КГ.

Метод виведення: Полікрос із сортів Керем x Феннема x СІ 5079, випробування, розмноження.

Ознаки сорту: Диплоїд. Габітус восени – проміжний, весною – середній. Тенденція утворення суцвіття на другий рік посіву - середня. Висота рослини весною – низька, на початку цвітіння – середня. Довжина та ширина прапорцевого листка – середній. Довжина найменшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – середній. Суцвіття: довжина (коли вони повністю сформовані) – середнє, кількість колосків (коли вони повністю розкриті) - середня.

Середньостиглий. Середня урожайність сухої речовини 51,4 ц/га, максимальна – 78 ц/га. Вміст білка 13,2%, клітковини – 30,6%. Зимостійкий. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Незначно уражується хворобами.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Костриця очеретяна

Смерічка. Оригіатор - Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Метод виведення: масовий добір високопродуктивних рослин сорту Балгика при вільному перезапиленні з сортом Івано-Франківська місцева.

Ознаки сорту: Диплоїд. Колір листка восени в рік посіву – світло-зелений. Ширина листка восени в рік посіву – середня. Рослина восени в рік посіву напівстояча. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву відсутня або дуже слабка. Час появи суцвіття на другий рік посіву – середня. Висота рослин при появі суцвіття – висока. Довжина прапорцевого листка (на середньому стеблі через дві неділі після появи суцвіття) – середня, ширина – від середньої до широкої. Довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) - від середньої до довгої. Довжина суцвіття – від середньої до довгої. Сорт сінокісного напрямку використання.

Середньостиглий. Середня урожайність сухої речовини 67,9 ц/га, насіння - 5-8 ц/га. Зимостійкий. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Незначно уражується хворобами. Висота рослин 120-169 см, дає два укуси. Вміст білка 9,7%, клітковини – 27,9%.
Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Чабанська. Оригіна́тор - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: сорт створений на основі міжсорткової гібридизації між кострицями очеретяними Kaibanka s Baskafall з використанням багаторазового індивідуального добору із посліду́ючим ізольованим розмноженням.

Ознаки сорту: Гексаплоїд. Колір листка восени в рік посіву – зелений. Листок восени в рік посіву - середньої ширини. Рослина восени в рік посіву - напівпохила. Тенденція утворювати суцвіття в рік посіву відсутня або дуже слабка. Час появи суцвіття на другий рік посіву - ранній. Висота рослин при появі суцвіття – висока. Прапорцевий листок: довжина і ширина на середньому стеблі в продовж двох тижнів після появи суцвіття – середня. Стебло: довжина верхнього міжвузля – від середнього до довгого; довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – від середнього до довгого. Довжина суцвіття, коли воно повністю сформоване – від середнього до довгого. Сорт середньостиглий (80 днів до першого укусу). Висота рослин 130см. Залистяність 51%. Куцистість висока. Маса 1000 насінин 2,63 г. Середня урожайність сухої речовини - 100,0 ц/га, максимальна – 122,8 ц/га, насіння – 5,0 ц/га. Вміст білка – 14,7%, клітковини - 26,0%. Сорт високоотавний, стійкий до вилягання та осипання, зимостійкий, посухостійкий, інтенсивно відростає після скошування. Стійкий до ураження хвороб, до витоптування і скошування. Довговічність – 5-7 років. В рік дає три укуси.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Костриця червона

Оленка. Оригіна́тор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Метод виведення: масовий добір низькорослих рослин з інтенсивним куцинням на матеріалі дикорослого зразка з Житомирської області.

Ознаки сорту: Диплоїд. Листок: зелений, вузький. Рослина: напівпрямостояча; тенденція утворення суцвіття в рік посіву відсутня або дуже слабка; час появи суцвіття (другого року) – ранній. Прапорцевий листок: довжина – середня, ширина – від вузького до середнього. Стебло: довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли воно повністю сформоване) – від короткого до довгого; довжина верхнього міжвузля - середня. Довжина суцвіття (коли повністю сформовано) - від короткого до середнього.

Сорт стійкий до ураження хворобами, зимостійкий, посухостійкий, декоративний, придатний для газонів загального призначення. Сходи появляються на восьмий день після посіву.

Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.