

## Тонконіг фіолетовий

**Алекс.** Оригіатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Листова обгортка: антоціанове забарвлення відсутнє або слабке; густина опушення по краях відсутня або дуже не густа; густина опушення з обох боків прямо під листовою пластинкою відсутнє або дуже не густе; довжина опушення лігули відсутнє або дуже коротке. Листова пластина: густина ворсинок опушення по краях основи відсутнє або дуже не густе; густина опушення верхньої частини - відсутнє або дуже негусте. Листок: колір восени в рік посіву світло-зелений; ширина – дуже низька; післязимове пожовтіння (наприкінці зимового періоду) – слабке. Час утворення суцвіття (на другий рік) – раннє. Прапорцевий листок середньої довжини, вузький. Стебло коротке, довжина верхнього міжвузля (коли воно повністю сформоване) - середня. Суцвіття: антоціанове забарвлення (коли вони повністю сформовані) – сильне; форма головної осі напроти нижніх бокових гілочок (коли вони повністю сформовані) – пряма; розміщення нижніх бокових гілочок (коли вони повністю сформовані) – горизонтальні; форма шийки головної осі напроти нижніх бокових гілочок (коли вони повністю сформовані) – закрита; довжина (коли вони повністю сформовані) - довгі.

Сорт зимостійкий, посухостійкий, стійкий до ураження хворобами.

Декоративний, має тонке стебло, вузьке листя, особливо гарний темно-зелений колір. Добре проявляє себе на схилах. Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.

## Райграс високий

**Дронго.** Оригіатор - Інститут кормів УААН.

Сорт створений добром гібридної популяції Дикоростучий /к-28627/, Вірменія х Полтавський 521.

Кущ нещільний. Стебло: округлої форми, гладеньке, м'яке, без опушення, коричневого кольору, 4-6 міжвузля. Костистість сильна -50-70 стебел. Залистяність 45-50%. Листки довгі до 25-30 см, вузькі, плоскі, опушення відсутнє, світло-зеленого кольору, восковий наліт відсутній, м'які, відхилені від стебла. Язичок короткий, дрібнозубчастий, тупий. Суцвіття – волоть, зжата, довжиною 15-20 см, середня ступінь рихлості, зеленувато-жовтого кольору. Колоски: прямі, світло-жовтого кольору, дві квіточки, кіль тонкий, незначний. Насіння: видовжена зернівка, 4-5 мм, округло веретеноподібної форми, світло-жовтого кольору. Коренева система мичкувата, сильно розвинена. Відрізняється від інших сортів наявністю антоціанового забарвлення колоскових лусок в фазі молочної стиглості.

Сорт середньостиглий, сінокісного напрямку використання, високопродуктивний. Середня урожайність сухої речовини становить 129,0 ц/га, максимальна -136,0 ц/га. Вміст протеїну - 13,5%, клітковини – 26,5%. Сорт зимостійкий, стійкий до вилягання, осипання, посухи та ураження хворобами.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся..