

Кущ напівпрямостоячий. Стебло міцне, товсте, в період колосіння ніжне, круглої форми, висотою 160-175 см, 6-7 міжузля, кущистість сильна. Залистяність середня. Листки зеленого кольору. Колоски білі іноді рожеві. Остюки білі, малі. Насіння подовженої форми, яскраво-червоного кольору. Маса 1000 зерен 36,6 г.

Пізньостиглий, вегетаційний період 280 днів.

Зимостійкий. Стійкий до вилягання, посухи. Хворобами уражується не значно. Урожайність сухої речовини 111,8 ц/га, насіння – 49,1 ц/га. Вміст білка 10,1%, клітковини – 30,3%.

Сорт відрізняється від інших сортів білим колосом та не опушеним стеблом під колосом.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

Чародій. Оригінатор: Луганський інститут агропромислового виробництва УААН.

Метод виведення: Добір з гібридної популяції (АД 465 x ПРАГ 48/4) x Донський 1.

Гексаплоїд. Форма куща - проміжний. Частота рослин з похилим пропорцевим листком - низька. Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок - відсутнє або дуже слабке; наліт на піхві - слабкий; довжина пластинки - довга; ширина пластинки - середня. Початок колосіння: (перший колос спостерігається у 50% рослин) – пізнє. Антоціанове забарвлення остюків і піляків - відсутнє або дуже слабке. Колос: наліт – слабкий; розміщення остюків – на кінчику; забарвлення (при дозріванні) – білий; щільність – щільний; довжина без остюків – довгий; ширина (вигляд збоку) – середній. Опушення шийки стебла - відсутнє або дуже слабке. Висота рослини (стебло, колос, остюки) – дуже висока. Нижня колоскова луска: довжина першого зубця (колосок в середній третині колосу) – дуже короткий; розмір другого зубця (колосок в середній третині колосу) - відсутній або дуже малий; опушення зовнішньої поверхні (колосок в середній третині колосу) - відсутнє. Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою колоса і верхнім міжузлям) – порожниста. Зернівка: забарвлення у фенолі – світле. Пізньостиглий. Зимостійкий, стійкий до вилягання, частково уражається хворобами. Висота рослин 160 см. Маса 1000 зерен 40 г. Урожайність сухої речовини 178,0 ц/га. Вміст білка 5,3%, клітковини – 30,8%.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

АДМ 9 синтетик. Оригінатор - Миронівський інститут пшеници ім. В. М. Ремесло методом відбором складної гібридної популяції (6ТА 50 x Рознер) x АД206, суміш сестринських ліній.

Гексаплоїд. Тип розвитку – озимий. Рослини середньої висоти. Колеоптиль має середнє антоціанове забарвлення. Габітус проміжний. Частота рослин з похилим пропорцем - середня.

Пропорцевий листок: довжина - середня; ширина – широка; піхви зі слабким нальотом; антоціанове забарвлення вушок - слабке. Антоціанове забарвлення остюків та піляків – слабке. Остюки над кінчиком колоска -довгі. Опушення шийки стебла - сильне. Колос:

розміщення остиків по всій довжині; має середню щільність; довжина без остиків - довга; ширина - середня; наліт - слабкий. Соломина (виповнення у поперечному розрізі між основою колоса і верхнім міжвузлям) – порожниста.

Нижня колоскова луска: довжина першого зубця (колосок в середній третині колосу) – середня; розмір другого зубця – середній; опущення зовнішньої поверхні відсутнє. Забарвлення зернівки у фенолі середнє.

Сорт зимостійкий, стійкий до ураження хворобами та відносно стійкий до вилягання, формує щільний стеблостій, не потребує обробок гербіцидами та фунгіцидами. Забезпечує високим урожаєм зеленої маси – 420,5 ц/га і 45-70 ц/га зерна. Середньостиглий, достигає за 305 днів.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

Поліський кормовий. Оригінатор - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: індивідуальний відбір з гібридної комбінації: (АД ст. 483/77 і Краснодарська зернокормова) х АД 3/5.

Ознаки сорту: Тетраплоїд. Тип розвитку – озимий. Рослини середньої висоти. Колеоптиль має середнє антоціанове забарвлення. Габітур проміжний. Частота рослин з похилим прaporцем листком низька.

Прaporцевий листок: довжина - довга; ширина – широка; піхви зі слабким нальотом; антоціанове забарвлення вушок слабке. Антоціанове забарвлення остиків та піляків – середнє. Остики над кінчиком колоска - середні. Опушення шийки стебла відсутнє або дуже слабке.

Колос: розміщення остиків на верхній половині; має середню щільність; довжина без остиків - довгий; ширина – широкий; наліт - середній. Соломина (виповнення у поперечному розрізі між основою колоса і верхнім міжвузлям) – середня. Нижня колоскова луска: довжина першого зубця (колосок в середній третині колосу) – середня; розмір другого зубця - середній; опущення зовнішньої поверхні - відсутнє. Забарвлення зернівки у фенолі - середнє.

Сорт зимостійкий, стійкий до ураження хворобами та відносно стійкий до вилягання, формує щільний стеблостій, не потребує обробок гербіцидами та фунгіцидами.

Забезпечує високим урожаєм зеленої маси – 174,7 ц/га і 50-70 ц/га зерна. Середньоранній. Висота рослин 170-200 см.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

Щириця.

Садівська. Оригінатор - Сумський інститут агропромислового виробництва УААН.

Метод виведення - багаторазовий добір з місцевої гібридної популяції.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий. Стебло пряме, зеленого кольору, не опущене, гілчасте, висотою 275-350 см. Листки: форма овальна, зеленого кольору, без опущення, залистяність 48%. Суцвіття: веретеноподібне, зеленого кольору, довжиною 50-65 см. Бокові гілки прямі, 8-10 штук. Насіння кругле, без плівки, білого кольору, 1-1,5 мм розміром. Маса 1000 насінин 0,7 г. Має високу стійкість до посухи, поганої погоди та хвороб.