

розміщення остюків по всій довжині; має середню щільність; довжина без остюків - довга; ширина – середня; наліт - слабкий. Соломина (виповнення у поперечному розрізі між основою колоса і верхнім міжвузлям) – порожниста.

Нижня колоскова луска: довжина першого зубця (колосок в середній третині колосу) – середня; розмір другого зубця – середній; опушення зовнішньої поверхні відсутнє. Забарвлення зернівки у фенолі середнє.

Сорт зимостійкий, стійкий до ураження хворобами та відносно стійкий до вилягання, формує щільний стеблостій, не потребує обробок гербіцидами та фунгіцидами. Забезпечує високим урожаєм зеленої маси – 420,5 ц/га і 45-70 ц/га зерна. Середньостиглий, досягає за 305 днів.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

Поліський кормовий. Оригіатор - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: індивідуальний відбір з гібридної комбінації: (АД ст. 483/77 і Краснодарська зернокармова) x АД 3/5.

Ознаки сорту: Тетраплоїд. Тип розвитку – озимий. Рослини середньої висоти. Колеоптиль має середнє антоціанове забарвлення. Габітус проміжний. Частота рослин з похилим прапорцем листком низька.

Прапорцевий листок: довжина - довга; ширина – широка; піхви зі слабким нальотом; антоціанове забарвлення вушок слабке. Антоціанове забарвлення остюків та пиляків – середнє. Остюки над кінчиком колоска - середні. Опушення шийки стебла відсутнє або дуже слабке.

Колос: розміщення остюків на верхній половині; має середню щільність; довжина без остюків - довгий; ширина – широкий; наліт - середній. Соломина (виповнення у поперечному розрізі між основою колоса і верхнім міжвузлям) – середня. Нижня колоскова луска: довжина першого зубця (колосок в середній третині колосу) – середня; розмір другого зубця - середній; опушення зовнішньої поверхні - відсутнє. Забарвлення зернівки у фенолі - середнє.

Сорт зимостійкий, стійкий до ураження хворобами та відносно стійкий до вилягання, формує щільний стеблостій, не потребує обробок гербіцидами та фунгіцидами.

Забезпечує високим урожаєм зеленої маси – 174,7 ц/га і 50-70 ц/га зерна. Середньоранній. Висота рослин 170-200 см.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

Щириця.

Садівська. Оригіатор - Сумський інститут агропромислового виробництва УААН.

Метод виведення - багаторазовий добір з місцевої гібридної популяції.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий. Стебло пряме, зеленого кольору, не опушене, гілчасте, висотою 275-350 см. Листки: форма овальна, зеленого кольору, без опушення, залистяність 48%. Суцвіття: веретеноподібне, зеленого кольору, довжиною 50-65 см. Бокові гілки прямі, 8-10 штук. Насіння кругле, без плівки, білого кольору, 1-1,5 мм розміром. Маса 1000 насінин 0,7 г. Має високу стійкість до посухи,