

вилягання. Хворобами не уражається. Добре переносить підвищену вологість ґрунту та повітря. Середня урожайність сухої речовини 154,9 ц/га, максимальна - 305,2 ц/га, насіння - 5,2 ц/га. Вміст клітковини – 39,9%, білка – 13,9%. Сорт силосного напрямку використання. Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Галицька. Оригіатор - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Ознаки сорту: Вид - волотистий, біло-насінний. Куці прямостоячий. Стебло пряме, зеленого кольору, не опушене, гілчасте, висота 175 см. Листки: форма овальна, жовто-рожевого кольору, без опушення, залистяність 48%. Суцвіття: веретеноподібне, кремового кольору, довжиною 65-75 см. Бокові гілки прямі, 8-10 штук. Насіння кругле, без плівки, світло-жовтого кольору, 1-1,5 мм розміром.

Маса 1000 насінин 0,7 г. Мас високу стійкість до посухи, вилягання. Хворобами не уражається. Добре переносить підвищену вологість ґрунту та повітря..

Сорт зернового напрямку використання. Стійкий до посухи та вилягання. Вміст клітковини – 23,1%. Зерно характеризується високим вмістом білка 19-21%, жиру – 9,6% та високоякісного крохмалю, завдяки чому його можна використовувати в дитячому та дієтичному харчуванні, як добавку до хлібобулочних та кондитерських виробів.

Середня урожайність сухої речовини 110,7 ц/га, максимальна - 118,0 ц/га, насіння - 23,8 ц/га.

Сорт середньостиглий. При вирощуванні на зерно необхідно проводити широкорядні посіви з міжряддям 45-70см, що дає змогу боротися із бур'янами на ранніх фазах розвитку. Збирати зерно необхідно після природного висихання листя.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

Сем. Оригіатор - Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва.

Метод виведення: індивідуального добору з популяції *A. hurochondriacus* невідомого походження.

Сім'ядольні листки: забарвлення пурпурове, помірне забарвлення амарантиним. Листок: забарвлення пурпурове, колір жилкування - пурпурове, форма - широкоовальна, розмір - великий, опушеність відсутня, довгочерешковий, опушеність черешка відсутня. Стебло: форма – прямостояча, опушеність відсутня, забарвлення - рожеве. Квітка: 5 та більше листочків оцвіттини, форма листочків оцвіттини не визначена, забарвлення пурпурове, верхівка листочків оцвіттини та середня жилка листочків не визначені. Приквітки: розмір перевищує оцвітнину в 1,5 рази, форма верхівки без загострення. Суцвіття: забарвлення пурпурове, розташування на стеблі верхівкове, щільність - розлоге, фасціації відсутні. Насіння: забарвлення біле, розмір - крупне. Висота рослини під час цвітіння - середня.

Апробаційні ознаки: характеризується пурпуровим забарвленням волоті та листя, розлогої форми волоті; має біле насіння.

Середня урожайність зерна -23,0 ц/га. Маса 1000 насінин 0,7 г. Сорт стійкий до посухи, вилягання, обсіпання. Вміст білка в насінні 19,5%, олії - 6,7%. Сорт зернового напрямку використання. Вегетаційний період 110-115 днів.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.