

першої квітки - середня. Біб: довжина (на другому квітучому вузлі) - дуже довгий, максимальна ширина (на другому квітучому вузлі) - широкий, пергаментність - цілковито наявна, ступінь вигину - відсутній або дуже слабкий, форма зовнішньої частини - тупа, колір - зелений, антоціанове забарвлення шву - відсутнє, плями антоціанового забарвлення на зовнішній стороні стулки - відсутні, число насінних зачатків - середнє, інтенсивність зеленого забарвлення незрілих насінин - темний. Насіння: час досягання - пізнє, зморшкуватість сім'ядолі - наявна, ступінь зморшкуватості сім'ядолі - середня, маса - велика.

Сорт відрізняється від подібного сорту Поліська-1 по забарвленню насінневої оболонки (жовте без плям). Середня урожайність сухої речовини 64,5 ц/га, насіння - 11,3 ц/га. Вміст білка - 19,6%, клітковини - 6,6%. Сорт стійкий до посухи, має середню стійкість до вилягання. Плоди мають здатність розтріскуватись, тому збирають насінники при 60% стиглості. На зелений корм збирають під час цвітіння, яке починається через 70-75 днів вегетації.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Мальва кучерява

Рада. Оригіатор - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАНУ.

Метод виведення: Внутрішньовидова гібридизація і багаторазовий відбір популяції з НБС НАНУ, інституту ВІР та республіки Комі.

Ознаки сорту: Куц зібраний. Стебло: пряме, округлої форми внизу та неправильно - округлі зверху, товщина на висоті 15 см - 15-17 мм, світло-зеленого кольору, без опушення. Висота рослин в середньому 179-210 см. Куцистість середня. На куці від 13 до 16 пагонів. Листки: довго-черешкові; форма 7-5-ти лопатеві, хвилясто-гофровані, світло-зеленого кольору, положення листків на рослині спіральне, листки дуже соковиті, ніжні, не опушені. Залістяність 45%. Суцвіття - завиток, квітки дрібні діаметром 8-12 мм, актиноморфні, блідо-рожевого кольору. Плід: відкрита коробочка, діаметром 7-12 мм, 9-11 плодиків у коробочці які зібрані у кільце. Насіння: світло-коричневого кольору, округло-ниркової форми, довжиною 2,5-2,9 мм, шириною - 2,2-2,8 мм, товщиною 1,8-2,0 мм.

Сорт відрізняється від подібного сорту Унава хвилясто-гофрированою формою листової пластинки та її світло-зеленим кольором.

Сорт можна вирощувати на різних типах ґрунтів крім дуже заболочених та кислих. Норма висіву - 750-760 тис.шт. схожих насінин на 1га чи 5-6 кг/га. Строки сівби: на насіння - 3-тя декада квітня або 1-ша декада травня; на зелений корм - від ранньої весни до 3-ї декади червня. Обробіток: коткування поля до і після сівби, боронування після сходів, одне міжрядне рихлення. Збирання: на зелений корм - у фазі бутонізації - цвітіння; на силос - на початку плодоношення. Сорт дає два укоси, добре відростає після скошування і формує 200-300ц/га отави. Середньопізній. Не уражається хворобами, стійкий до вилягання, засухи. Вміст білка 19,4%, клітковини - 20,1%, цукру в зеленій масі - 6,2%. Середня урожайність сухої речовини 76,1ц/га, насіння - 17,3ц/га.

Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.