

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 15088013 Назва сорту:** Каптіва**Заявник (код):** 1046 **Власник сорту (код):** 1046**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.03.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210523****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	малий	3	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні лагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	вузькі	3	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3	
23	Листочек: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочек: заглиблення жилок	глибоке	7	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	глянсуватий	7	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час достигання	середній	5	
37	Бульба: форма	видовжена	5	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	C	L	P
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	160,3	162,7	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	27,0	13,3	
Урожайність, ц/га	238,7	252,3	
+ - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	78,4	89,6	
+ - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	49	55	
Вміст крохмалю, %	14,4	13,8	
Збір крохмалю, ц/га	34,4	34,8	
Вміст сухої речовини, %	21,7	21,2	
Тривалість періоду вегетації, діб	95	96	
Середня маса товарної бульби, г	139,6	91,7	
Товарність бульб, %	77,7	76,0	
Лежкість, бал	7	9	
Дегустаційна оцінка, бал	9	9	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Стійкий	Стійкий	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фітофторозу, бал	9	9	
Напрям використання	СТЛ	СТЛ	
Якість	СКР	СКР	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.