

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata***Заявка № 19421008 Назва сорту:** АЙС МЮЗІК **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959**Дата пріоритету:** 30.10.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 07.04.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210538****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насініна: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: стім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0	
4	Сіянець: форма стім'ядолей	ознака не визначалась	0	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпрямле	3	від напів-прямого до розлого
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	до великого
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	слабке	3	
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
11	Головка: розмір	середній	5	до великого
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	1	
14	Листок: за товщиною	тонкий	3	до середнього
15	Листок: положення за зіральної стигlosti (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів	ознака не визначалась	0	
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3	до помірної
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	до середнього
27	Листкова пластинка: хвильистість краю	слабка	3	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3	до помірної
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3	до помірної
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
34	Час зіральної стигlosti	середній	5	до пізнього
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	низька	3	
37	Рослина: фасциація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасциації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошистої роси (<i>Vremia lactucae</i>) Isolate B1: 16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	ознака не визначалась	0	
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприяливий (відсутній)	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 50. Середня маса головки, г – 650. Щільність головки, бал (1–9) – 7. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стигlosti, діб – 60. Група стигlosti: 7 – пізня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 6, цукрів, % – 4, вітаміну С, мг% – 22. Холодостійкість, бал (1–9) – 6. Посухостійкість, бал (1–9) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Згр.