

**Вид:** Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

**Заявка №** 20304001 **Назва сорту:** Кекфранкос **Заявник (код):** 2704 2705 **Власник сорту (код):** 2704 2705

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 13.04.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 210539

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	середній	5	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	нещільна	3	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	темно-мідно-червоне	5	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	дуже щільна	9	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	дуже щільна	9	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене і червоне	2	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напіввідкрите	3	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	короткі	3	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	дуже мале	1	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	висока	7	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	середня	5	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	щільна	7	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	пізній	7	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	великий	7	
33	Гроно: за щільністю	нещільне	3	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	великий	7	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорне	9	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	важке	1	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	помірне	5	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	червонувато-коричневе	4	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 10,0. Середній урожай з куща, кг – 2,5. Середня маса 100 ягід, г – 350,0. Середня маса грона, г – 350,0. Горішність ягід, % – 3,0. Розтріскування ягід, % – 1,0. Лежкість при зберіганні, дів – 1. Вихід соку, % – 75,0. Вміст диглікозидів, мг/дм<sup>3</sup> – не визначався. Вміст кислот у ягодах, г/л – 6,5. Цукристість соку ягід, % – 22,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8, мілдью – 7, оїдіум – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 8, філоксера – 9. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, дів – 170. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3, лози – 3. Група стиглості – пс. Напрямок використання – тхн. Схема садіння, м – 2,5 × 1,0. Транспортність, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.