

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 20304002 Назва сорту: Фурмінт **Заявник (код):** 2704 2705 **Власник сорту (код):** 2704 2705

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.04.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210540

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	пізній	7	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	щільна	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	середня	5	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	жовто-зелене	1	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	дуже щільна	9	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	дуже щільна	9	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	вертикальне	1	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	короткі	3	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	мале	3	
26	Розвинений листок: форма зубців прямолінійними боками та обома випуклими	посідання зубців із обома	5	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	щільна	7	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	щільна	7	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	пізній	7	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	довга	7	
35	Ягода: розмір	великий	7	
36	Ягода: форма	тупояйцеподібна	6	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовте	3	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	тонка	1	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 10,0. Середній урожай з куща, кг – 2,4. Середня маса 100 ягід, г – 300,0. Середня маса грона, г – 300,0. Горощіння ягід, % – 5,0. Розтріскування ягід, % – 1,0. Лежкість при зберіганні, днів – 1. Вихід соку, % – 75,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 0,5, кислот у ягодах, г/л – 7,0. Цукристість соку ягід, % – 25,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 7, мілдью – 8, оїдіум – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 8, філоксера – 9. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, днів – 180,0. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3, лози, бал (1–9) – 3. Група стиглості – пс. Напрямок використання – тхн. Схема садіння, м – 2,5 × 1,0. Транспортальність, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.