

Вид: Лілійник *Hemerocallis* L.**Заявка № 17326004 Назва сорту:** Зірница **Заявник (код):** 827 **Власник сорту (код):** 827**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.04.2021 **Патент № 210634****Дата пріоритету:** 29.09.2017**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 07.04.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210531****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|------------------------------------|-----|---|
| 1 | Плоїдність | диплоїд | 2 | |
| 2 | Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт) | міцно спляча | 1 | |
| 3 | Рослина: час початку вегетації | середній | 5 | |
| 4 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 5 | Рослина: габітус | розлогий | 2 | |
| 6 | Листок: положення у просторі | поникле біля верхівки | 2 | |
| 7 | Листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 8 | Листок: за шириною | середній | 5 | |
| 9 | Листок: забарвлення | світло-зелене | 1 | |
| 10 | Квітконос: розташування відносно листків | нарівні з листками або трохи нижче | 1 | |
| 11 | Квітконос: залишяльність | відсутня | 1 | |
| 12 | Суцвіття: за щільністю | нещільне | 1 | |
| 13 | Суцвіття: приквітки | наявні | 9 | |
| 14 | Суцвіття: за довжиною | середнє | 5 | |
| 15 | Час цвітіння | середньоранній | 3 | |
| 16 | Рослина: тип цвітіння | звичайний | 1 | |
| 17 | Рослина: характер цвітіння | денне | 1 | |
| 18 | Рослина: тривалість цвітіння | середня | 5 | |
| 19 | Квітка: кількість на рослині | мала | 3 | |
| 20 | Квітка: кількість відкритих на рослині | велика | 7 | |
| 21 | Квітка: діаметр | малий | 3 | |
| 22 | Квітка: за типом | проста | 1 | |
| 23 | Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма | округла | 1 | |
| 24 | Квітка: забарвлення (кольорова група) | пурпурове | 5 | |
| 25 | Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини | змішана | 2 | |
| 26 | Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки | коричнево-пурпурове | 26 | |
| 27 | Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки | жовто-оранжеве | 13 | |
| 28 | Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки | коричнево-пурпурове | 26 | |
| 29 | Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки | жовто-оранжеве | 13 | |
| 30 | Квітка: візерунок | вічко | 2 | ореол, середня лінія |
| 31 | Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвітини | світло-жовто-коричневе | 43 | коричневе (RHS 175B), світло-жовто-коричневе (RHS 163B) |
| 32 | Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення | пурпурово-чорвоне | 23 | |
| 33 | Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення | жовто-коричневе | 44 | |
| 34 | Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 35 | Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 36 | Квітка: аромат | відсутній | 1 | |
| 37 | Оцвітина: відносне розташування часток | дотичне | 3 | |
| 38 | Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки | слабко або сильно відігнуті донизу | 3 | |
| 39 | Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки | слабко або сильно відігнуті донизу | 3 | |
| 40 | Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки | тупа | 4 | |
| 41 | Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки | стисла | 2 | |
| 42 | Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки | гофрована | 3 | |
| 43 | Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки | хвиляста | 2 | |
| 44 | Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки | рівна | 1 | |
| 45 | Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки | рівна | 1 | |
| 46 | Квітка: трубка оцвітини за довжиною | коротка | 1 | |
| 47 | Квітка: за довжиною тичинки | довга | 7 | |
| 48 | Тичинка: основне забарвлення | світло-жовто-коричневе | 43 | |
| 49 | Тичинка: забарвлення піляків | коричневе | 3 | |
| 50 | Пилок: забарвлення | жовте | 2 | |
| 51 | Пилок: життєздатність | нилька | 3 | |
| 52 | Плід: відсоток плодоцвітіння | нилький | 3 | |
| 53 | Стовпчик: основне забарвлення | світло-жовто-коричневе | 43 | |
| 54 | Квітка: положення приймочки відносно піляків | вище | 7 | |
| 55 | Приймочка: забарвлення | жовто-оранжеве | 13 | |
| 56 | Рослина: тривалість періоду вегетації | мала | 3 | |

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 60,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 125. Тривалість цвітіння суцвіття, діб – 10. Тривалість цвітіння рослини, діб – 25. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: 1 – відсутнє. Декоративність, бал (11–99) – 90. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 40,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): комарик лілійника (*Contarinia quinquenotata*) – 8, павутинний кліщ (*Arachnids*) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі кореневої шийки (*Fusarium, Phytophthora, Sclerotium, Rhizoctonia, Pythium*) – 8, хлороз (*Chlorosis*) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.