

Вид: Костриця шорстколиста *Festuca brevipila* R. Tracey

Заявка № 20437001 Назва сорту: Сиза **Заявник (код):** 1658

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.05.2021 **Патент № 210664**

Дата пріоритету: 23.06.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: плоідність | диплоїд | 2 | |
| 2 | Піхва листка: антоціанове забарвлення | помірна | 5 | |
| 3 | Рослина: за природною висотою | середня | 5 | |
| 4 | Рослина: габітус | проміжний | 5 | |
| 5 | Листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 6 | Лише для сортів костриці червоної: листок: за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 7 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 8 | Листок: сизий наліт | наявний | 9 | |
| 9 | Рослина: формування кореневища | середнє | 2 | |
| 10 | Рослина: час появи суцвіття | ранній | 3 | |
| 11 | Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують) | середня | 5 | |
| 12 | прапорцевий листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 13 | Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 14 | Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина | ознака не визначається | 0 | |
| 15 | Рослина: найдовше стебло за довжиною, включаючи волоть | середнє | 5 | |
| 16 | Рослина: верхнє міжвузля за довжиною | середнє | 5 | |
| 17 | Волоть: за довжиною | середня | 5 | |
| 18 | Волоть: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,04. Поява сходів після сівби, діб – 3–5. Маса 1000 насінин, г – 1,02. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Загальна декоративність, бал (9–30): навесні – 25, влітку – 28, восени – 23. Проективне покриття, %: до скошування – 88, після скошування – 91. Щільність паростків, % – 86. Стійкість до витоптування, бал (1–9) – 9. Темпи відростання: 5 – рівномірне. Стійкість до хвороб, балів (1–9): стеблова іржа – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.