

Патент №: 07324 Заявка №: 97075002

Вид: Горіх грецький Juglans regia L.

Назва сорту Рудківський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1997

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|---|-----|
| 1 | Дерево: за силою росту | сильне | 7 |
| 2 | Дерево: габітус | розлогий | 7 |
| 3 | Дерево: щільність розміщення гілок | середня щільність | 5 |
| 4 | Дерево: розміщення генеративних бруньок | переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2 років (плодоношення у скупчених) | 2 |
| 5 | Річний пагін: за кольором | світло-коричневий | 2 |
| 6 | Листок: форма бічних листочків | еліптична | 5 |
| 7 | Квітка: кількість чоловічих суцвіть | багато | 7 |
| 8 | Горіх: за розміром | великий | 7 |
| 9 | Горіх: форма у повздовжньому перерізі через шов | широко-трапецієвидна | 5 |
| 10 | Горіх: форма у повздовжньому перерізі перпендикулярно до шва | широко-трапецієвидна | 5 |
| 11 | Горіх: форма у поперечному перерізі | округла | 2 |
| 12 | Горіх коефіцієнт округлості | низький | 3 |
| 13 | Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва) | зрізана | 7 |
| 14 | Горіх: форма верхівки (як для 13) | округла | 2 |
| 15 | Горіх: помітність апікального кінчика | помірна | 5 |
| 16 | Горіх: положення "сідельця" на шві | у верхній 2/3 | 2 |
| 17 | Горіх: помітність сідельця на шві | помірна | 5 |
| 18 | Горіх: ширина "сідельця" на шві | помірне | 5 |
| 19 | Горіх: глибина боріздки вздовж "сідельця" на шві | неглибока | 1 |
| 20 | Горіх: структура поверхні шкаратупи | слабко боріздчаста | 1 |
| 21 | Горіх: товщина шкаратупи | тонка | 3 |
| 22 | Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаратупи | слабка | 3 |
| 23 | Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок | тонкі | 3 |
| 24 | Ядро: легкість видалення зі шкаратупи | легке | 3 |
| 25 | Ядро: за інтенсивністю основного кольору | світле | 3 |
| 26 | Ядро: за розміром | велике | 7 |
| 27 | Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха | середнє | 5 |
| 28 | Час досягання | ранній | 3 |
| 29 | Час листопаду | середній | 5 |
| 30 | Листок: здатність до обпадання | обпадає | 2 |
| 31 | Оплодень: здатність до обпадання | повністю обпадає | 3 |
| 32 | Час розпукування вегетативних бруньок | ранній | 3 |
| 33 | Час цвітіння чоловічих квіток | діж дуже раннім і раннім | 2 |
| 34 | Час цвітіння жіночих квіток | між пізнім і дуже пізнім | 8 |
| 35 | Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими | раніше (протендрійний) | 1 |