

Вид: Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor*

Заявка № 17094001 Назва сорту: ТІФФАНИ **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.07.2018 **Патент № 180921**

Дата пріоритету: 12.01.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.07.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180790

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листя: забарвлення	помірно зелене	2
2	Час цвітіння (50 % рослин хоча б з однією квіткою)	середній	5
3	Лише для сортів з меланіновою плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	довгий	7
5	Листочок: за шириною	середній	5
6	Листочок: місце максимальної ширини	посередині	2
7	Квітка: за довжиною	коротка	3
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	мале	3
12	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
13	Рослина: за висотою	середня	5
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	середня	5
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5
16	Біб: за шириною (від шва до шва)	вузький	3
17	Суша насінина: форма повздовжнього розрізу	неправильної форми	3
18	Суша насінина: маса 100 насінин	середня	5
19	Суша насінина: забарвлення насінневої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1
20	Суша насінина: чорна пігментація рубчика	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння, т/га – 5,9. Урожайність зеленої маси, т/га – 6,2. Вміст білка в зеленій масі, % – 25,5. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 6. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб: бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F.Sm.), бал (1–9) – 7; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.), бал (1–9) – 6; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.), бал (1–9) – 5; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.), бал (1–9) – 7. Стійкість проти шкідників: бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Boh.), бал (1–9) – 5; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.), бал (1–9) – 6; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.), бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.