

Сільськогосподарські: злаки
Пшениця м'яка озима

03007026 Віга

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "АгроІнтер"

Різновидність Lutescens. Тип розвитку — озимий. Кущ — напіврозлогий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, піраміdalnoї форми, середньої щільності, довгий із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече скосене та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, широка, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Рослини заввишки 80-86 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,7-8,9 бала. Сорт більш посухостійкий, стійкість до посухи 8,2-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 281-294 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 62,6 ц/га, в зоні Лісостепу — 73,6 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу — 7,9 ц/га, в зоні Лісостепу — 2,4 ц/га. Маса 1000 зерен 40,4-42,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добри. Зерно містить 13,4-13,5% білка, клейковини 27,6-28,4%. ІДК — 75-80 о.п., сила борошна — 277-303 о.а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1050-1080 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Цінна пшениця. Сорт інтенсивного типу.

04007006 Господарня

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече пряме та вузьке, зубець ледь зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 79-86 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,1-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,0-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 276-287 діб. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 60,5 ц/га, в зоні Лісостепу — 66,4 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу — 5,8 ц/га, в зоні Лісостепу — 0,9 ц/га. Маса 1000 зерен 37,6-40,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добри та відмінні. Зерно