

зовнішньої — слабке, овально-ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — тупі.

Висота рослин 74-82 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,3-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 7,6-8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 283-287 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 50,8 ц/га, в зоні Лісостепу — 63,0 ц/га. Прибавка до національного стандарта — 0,2 ц/га. Маса 1000 зерен 39,5-43,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 15,1-15,4% білка, клейковини 32,4-33,2%, ІДК — 60 о.п., сила борошна — 403-418 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100-1180 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2-8,3 бала. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

## ® 03007023 Лист 25

**Заявник:** Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

**Власник(и):** Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

**Підтримувач(и):**

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Пропорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене та середньої ширини, зубець леді зігнутий і середньої довжини, опущення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке, овально-ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 77-79 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,0-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 283-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 64,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 65,9 ц/га. Прибавка до національного стандарта в Степу — 5,4 ц/га, Лісостепу — 3,1 ц/га. Маса 1000 зерен 40,5-40,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добри. Зерно містить 13,4-13,7% білка, клейковини 29,1-29,2%, ІДК — 75-80 о.п., сила борошна — 296-367 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1030-1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,1 бала. Цінна пшениця.

## 01007013 Оксана

**Заявник:** Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Пропорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявною другою вершиною та широке, зубець леді зігнутий і довгий, опущення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня - вищесередня, у польових умовах за роки випробування

зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 283 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 58,9 ц/га. Прибавка до національного стандарта — 0,3 ц/га. Маса 1000 зерен 36,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добри. Зерно містить 13,9% білка, клейковини 29,4%, ІДК — 50 о.п., сила борошна — 356 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2 бала. Цінна пшениця.

### **03007038 Почесна (Престиж)**

**Заявник:** Північно-Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Донського зонального науково-дослідного інституту сільського господарства

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прарорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з дуже сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушеннем опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, піраміdalної форми, середньої щільності та довжини із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець прямий і короткий, опушенння внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 99-103 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,4-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 281-292 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,5 ц/га, Лісостепу — 64,8 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу — 4,8 ц/га. Маса 1000 зерен 40,7-42,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добри та відмінні. Зерно містить 14,3% білка, клейковини 30,6-31,3%, ІДК — 65-75 о.п., сила борошна — 329-464 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100 - 1170 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2-8,5 бала. Сильна пшениця.

### **® 03007004 Попелюшка**

**Заявник:** Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прарорцевий листок має дуже слабкий або відсутній восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушеннем опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, піраміdalної форми, середньої щільності та довжини із дуже слабким або відсутнім восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене та середньої ширини, зубець середньо зігнутий і дуже короткий, опушенння внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 80-86 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,1-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 280-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 64,5 ц/га, Лісостепу — 70,0 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу —