

Вид: Костриця лучна *Festuca pratensis* Huds.

Заявка № 15204003 Назва сорту: Веста **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.05.2018 **Патент № 180925**

Дата пріоритету: 05.11.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.05.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180806

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Лише для F.p. Рослина: габітус	напівпрямий	3
3	Лише для F.a. Листки: за фактурою	ознака не визначалась	0
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення протягом вегетаційного періоду	помірна	5
5	Лише для F.p. Рослина: за довжиною (наприкінці вегетаційного періоду до яровизації)	середня	5
6	Рослина: тенденція до формування суцвіття (без яровизації)	відсутня або дуже слабка	1
7	Рослина: за природною висотою після яровизації (близько 4 тижнів після початку вегетації)	середня	5
8	Рослина: час утворення суцвіття (після яровизації)	пізній	7
9	Рослина: габітус з появою суцвіття	напівпрямий	3
10	Рослина: за природною висотою з появою суцвіття	середня	5
11	Рослина: найдовше стебло із суцвіттям включно за довжиною (за повного формування)	середнє	5
12	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
13	Суцвіття: за довжиною (як для 11)	середнє	5
14	Прапорцевий листок: за довжиною на типовому стеблі (як для 11)	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %) – 0,68 т/га. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини – 58,8/10,8 т/га. Вміст білка – 10,6 %, клітковини – 27,4 %. Висота рослин – 127 см. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості – 91 доба. Маса 1000 насінин – 2,0 г. Зимостійкість, посухостійкість – 8 балів. Стійкість до вилягання – 9, до осипання – 7 балів. Стійкість до ураження збудниками борошнистої роси, сажки, стеблової іржі, бурої іржі, антракнозу, снігової плісняви – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.