

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої довжини, нещільний, із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече округле та середньої ширини, зубець прямий і дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, коротка, вузька, дрібна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — тупі.

Висота рослин 86-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,0-8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 278-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 62,4 ц/га, в зоні Лісостепу — 66,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 3,8 ц/га, в зоні Лісостепу — 3,5 ц/га. Маса 1000 зерен 38,0-38,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,7-14,1% білка, клейковини 28,1-31,1%, ІДК — 65-70 о.п., сила борошна — 379-402 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1080-1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Сильна пшениця.

### ® 04007011 Хуртовина

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук  
Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Підтримувач(і):

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, довгий, середньої щільності із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець прямий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 90-96 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 281-287 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,7 ц/га, в зоні Лісостепу — 64,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,0 ц/га. Маса 1000 зерен 38,3-40,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9-14,1% білка, клейковини 29,7-30,2 %, ІДК — 65-70 о.п., сила борошна — 348-358 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Сильна пшениця.

### ® 03007001 Шестопалівка

Заявник: Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідне підприємство "БОР"

Власник(и): Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідне підприємство "БОР"

Підтримувач(і): Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої



щільності та довжини, із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та вузьке, зубець ледь зігнутий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, овальної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 86-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,1-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 278-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,5 ц/га, в зоні Лісостепу — 65,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 4,8 ц/га. Маса 1000 зерен 42,6-44,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2-14,3% білка, клейковини 29,4-30,5%, ІДК — 75 о.п., сила борошна — 337-382 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100-1180 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2-8,4 бала. Сильна пшениця.

## Пшениця м'яка яра

### ® 04007027 Аранка

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и): Осева Ексімпо Прага с.р.о.

Приватне мале підприємство " Тирас"

#### Підтримувач(і):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і помірно антоціанове забарвлення вушок. Соломина помірно виповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявною другою вершиною та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, середня за крупністю. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 67-77 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,7 бала. Стійкість до посухи 7,8-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 99-104 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 39,7 ц/га, в зоні Лісостепу — 46,3 ц/га, в зоні Полісся — 43,9 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Степу — 12,3 ц/га, в зоні Лісостепу — 8,2 ц/га, в зоні Полісся — 6,2 ц/га. Маса 1000 зерен 37,9-39,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,6-14,1% білка, клейковини 29,2-31,7 %, ІДК — 65-75 о.п., сила борошна — 284-356 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1050-1080 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Сильна пшениця.

### ® 03007034 Недра

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

#### Підтримувач(і):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, дуже нещільний, довгий із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене та вузьке, зубець прямий і дуже довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини