

та ширини, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гостри.

Висота рослин 98 см. Стійкість сорту до вилягання 8,0 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,6 бала. Стійкість до посухи 8,5-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 102-104 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 40,5 ц/га, в зоні Полісся — 40,9 ц/га, стабільна по роках та місцях випробування. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 2,9 ц/га, в зоні Полісся — 3,6 ц/га. Маса 1000 зерен 41,4-42,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,0-14,4% білка, клейковини 27,1-31,1%, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 260-350 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1000-1050 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Цінна пшениця.

® 04007042 Стависька

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет
Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Підтримувач(и):

Різновидність Lutescens. Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Пропорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і помірне антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої довжини, зубець ледь зігнутий і короткий, опущення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, овальної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — довгий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — тупі.

Висота рослин 102-105 см. Стійкість сорту до вилягання 7,6-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 104-105 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 40,6 ц/га, в зоні Полісся — 39,6 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 9,2 ц/га, в зоні Полісся — 7,1 ц/га. Маса 1000 зерен 39,6-40,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,0-13,1% білка, клейковини 27,0-27,2 %, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 264-270 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 990-1000 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Цінна пшениця.

® 04007047 Сюїта

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявною другою вершиною та вузьке, зубець середньо зігнутий і короткий, опущення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — відсутній, вушка — гостри.

Висота рослин 98-99 см. Стійкість сорту до вилягання 7,0 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 101-105 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 47,1 ц/га, в зоні Полісся — 42,6 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 9,0

ц/га, в зоні Полісся — 5,0 ц/га. Маса 1000 зерен 37,2-38,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добри та відмінні. Зерно містить 13,3-14,0% білка, клейковини 28,7-29,0%, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 342-424 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100-1150 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,3-8,5 бала. Сильна пшениця.

Пшениця тверда озима

® 03008001 Бурштин

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок має сильний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і слабке антоціанове забарвлення. Соломина помірновиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушеннем верхнього вузла. Колос червоного кольору, піраміdalnoї форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світло-коричневі. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене та середньої ширини, зубець дуже зігнутий та короткий, опушенні зовнішньої поверхні — відсутні. Зернівка напіввидовжена, має короткий чубок. Язичок — середній, кільцевої форми. Вушка: охоплення соломини — повне.

Висота рослин 82-83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня- нижчесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,3-8,4 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 276-290 діб. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 60,8 ц/га, в зоні Лісостепу — 56,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 1,2 ц/га, в зоні Лісостепу — 3,4 ц/га. Маса 1000 зерен 44,5-45,8 г. Зерно містить 14,2-14,3% білка, загальна оцінка макарон — 8,5 бала.

Пшениця тверда яра

® 04008001 Кучумовка

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність Valenciae. Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок має помірний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина слабовиповнена з дуже сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким, або відсутнім опушеннем верхнього вузла. Колос білого або соломяно - жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, чорного кольору. Нижня колоскова луска яйцеподібна, плече скошене та вузьке, зубець прямий, опушенні зовнішньої поверхні — наявне. Зернівка напіввидовжена, має короткий чубок. Язичок — середній, кільцевої форми, вушка: охоплення соломини — неповне.

Висота рослин 82-99 см. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,4 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 98-101 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 31,6 ц/га, в зоні Лісостепу — 40,9 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Степу — 6,5 ц/га, в зоні Лісостепу — 8,5 ц/га. Маса 1000 зерен 43,4-45,2 г. Вміст білка у зерні 13,7-14,3% Загальна оцінка макарон — 7,8 бала.