

Жито озиме**® 03003001 Сіверське****Заявник:** Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"**Власник(и):** Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"**Підтримувач(і):**

Рослина диплоїд, середньої висоти, форма куща напівпрямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із помірним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та сильне опушення під колосом. Колос середньої довжини, щільності, має горизонтальне положенням в просторі, та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила: в зоні Степу 50,2 ц/га, Лісостепу 55,2 ц/га, Полісся 54,4 ц/га. Гарантована добавка 5,6 - 7,6 ц/га. Вміст білку 10,3 - 11,8%, число падіння 232 - 265 с, загальна оцінка 6,5 - 8,4 балів. Зимостійкість на рівні 8,5 - 8,9 балів. Сорт відносно стійкий до ураження хворобами, вилягання, осипання та посухи.

04003001 Хамарка**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**Власник(и):****Підтримувач(і):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща напівпрямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із сильним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та сильне опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має похиле положенням в просторі, та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 56,5 ц/га. Гарантована прибавка 13,9 ц/га. Вміст білку 11,4%, число падіння 235 с, загальна оцінка 6,5 балів. Зимостійкість на рівні 8,4 балів. Сорт відносно стійкий до посухи, осипання, вилягання; ураження хворобами незначне.

® 03003002 Хлібне**Заявник:** Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**Власник(и):** Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**Підтримувач(і):**

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща прямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із помірним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та середньої довжини листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та дуже сильне опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має похиле положенням в просторі, та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 49,3 ц/га, Лісостепу 56,4 ц/га, Полісся 51,5 ц/га. Гарантована прибавка 2,6 - 7,6 ц/га. Зимостійкість на рівні 8,4 - 8,9 балів. Вміст білку 10,2 - 11,9%, число падіння 212 - 235 с, загальна оцінка 6,5 балів. Сорт відносно стійкий до