

**ЖИТО ОЗИМЕ****® 03003001 Сіверське**

**Заявник:** Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

**Власник(и):** Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

**Підтримувач(и):**

Рослина диплоїд, середньої висоти, форма куща напівпрямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із помірним антоціановим забарвленням. Пррапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпррапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та сильне опущення під колосом. Колос середньої довжини, щільноті, має горизонтальне положення в просторі, та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила: в зоні Степу 50,2 ц/га, Лісостепу 55,2 ц/га, Полісся 54,4 ц/га. Гарантована добавка 5,6 - 7,6 ц/га. Вміст білку 10,3 - 11,8%, число падіння 232 - 265 с, загальна оцінка 6,5 - 8,4 балів. Зимостійкість на рівні 8,5 - 8,9 балів. Сорт відносно стійкий до ураження хворобами, вилягання, осипання та посухи.

**04003001 Хамарка**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща напівпрямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із сильним антоціановим забарвленням. Пррапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпррапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та сильне опущення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має похиле положення в просторі, та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 56,5 ц/га. Гарантована прибавка 13,9 ц/га. Вміст білку 11,4%, число падіння 235 с, загальна оцінка 6,5 балів. Зимостійкість на рівні 8,4 балів. Сорт відносно стійкий до посухи, осипання, вилягання; ураження хворобами незначне.

**® 03003002 Хлібне**

**Заявник:** Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща прямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із помірним антоціановим забарвленням. Пррапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та середньої довжини листковою пластинкою. Підпррапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та дуже сильне опущення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має похиле положення в просторі, та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 49,3 ц/га, Лісостепу 56,4 ц/га, Полісся 51,5 ц/га. Гарантована прибавка 2,6 - 7,6 ц/га. Зимостійкість на рівні 8,4 - 8,9 балів. Вміст білку 10,2 - 11,9%, число падіння 212 - 235 с, загальна оцінка 6,5 балів. Сорт відносно стійкий до

вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### **04003002 Юр'ївець**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща напіврозлогий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із сильним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має слабкий восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та помірне опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має горизонтальне положення в просторі, та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із темним забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 58,8 ц/га, Полісся 50,9 ц/га. Гарантована добавка 2,0-16,2 ц/га. Вміст білку 11,7%, число падіння 179 - 238 с, загальна оцінка 6,6 балів. Зимостійкість на рівні 7,8 - 8,2 балів. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### **Тритикале озиме**

#### **02011006 Мудрець**

**Заявник:** Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: багато рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві - сильний, листкова пластинка довга та середньої ширини. Остики: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньо-виповнена, зі слабко опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, нещільний, вузький та середньої довжини, пірамідальної форми, пониклий. Вісь колосу — гнутика. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець середній. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабо зморшкувана.

Висота рослин 93 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня - підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 292 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 65,2 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Лісостепу — 4,1 ц/га. Маса 1000 зерен 53,1 г. Вміст білка в зерні 13,1%.

#### **® 03011002 Ратне**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком,