

вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04003002 Юр'ївець

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща напіврозлогий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із сильним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має слабкий восковий наліт та короткою листовою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та помірно опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має горизонтальне положенням в просторі, та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із темним забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 58,8 ц/га, Полісся 50,9 ц/га. Гарантована добавка 2,0-16,2 ц/га. Вміст білку 11,7%, число падіння 179 - 238 с, загальна оцінка 6,6 балів. Зимостійкість на рівні 7,8 - 8,2 балів. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

Тритикале озиме

02011006 Мудрець

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: багато рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві - сильний, листову пластинку довга та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньо-виповнена, зі слабко опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, нещільний, вузький та середньої довжини, пірамідальної форми, пониклий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець середній. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабо зморшкувата.

Висота рослин 93 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня - підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 292 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 65,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу — 4,1 ц/га. Маса 1000 зерен 53,1 г. Вміст білка в зерні 13,1%.

® 03011002 Ратне

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком,

антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві – дуже сильний, листкова пластинка дуже довга та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста з відсутнім або дуже слабким опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, нещільний, широкий та середньої довжини, циліндричної форми з горизонтальним положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, зморшкувата.

Висота рослин 112-125 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,4-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 285-303 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 61,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 62,4 ц/га, в зоні Полісся — 53,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 2,0 ц/га. Маса 1000 зерен 48,2-51,5 г. Вміст білка у зерні 11,9%.

Тритикале яре

® 03011009 Згурівський

Заявник: Вітвіцький Михайло Антонович

Власник(и): Вітвіцький Михайло Антонович
Приватне підприємство "Віткос"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напіврозлогий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — слабкий, листкова пластинка дуже коротка та широка. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста зі слабо опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої довжини, ширини та щільності, пірамідальної форми, пониклий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабо зморшкувата.

Висота рослин 94 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся — 45,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся — 4,3 ц/га. Маса 1000 зерен 45,4 г. Вміст білка 12,7%,

® 03011005 Кобзар

Заявник: Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Власник(и): Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — помірний, листкова пластинка коротка та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньо виповнена із сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої довжини та щільності, вузький, циліндричної форми, напівпрямий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, середня за крупністю, видовжена, зморшкувата.

Висота рослин 91-93 см. Стійкість сорту до вилягання — 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 104-105 діб.