

антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві – дуже сильний, листкова пластинка дуже довга та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста з відсутнім або дуже слабким опушеннем на верхньому міжвузлі. Колос: білий, нещільний, широкий та середньої довжини, циліндричної форми з горизонтальним положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, зморшкувана.

Висота рослин 112-125 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,4-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 285-303 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 61,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 62,4 ц/га, в зоні Полісся — 53,0 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу — 5,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 2,0 ц/га. Маса 1000 зерен 48,2-51,5 г. Вміст білка у зерні 11,9%.

Тритикале яре

® 03011009 Згурівський

Заявник: Вітвіцький Михайло Антонович

Власник(и): Вітвіцький Михайло Антонович

Приватне підприємство "Віткос"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напіврозлогий. Пропорцевий листок: мало рослин з похилим пропорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — слабкий, листкова пластинка дуже коротка та широка. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста зі слабко опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої довжини, ширини та щільності, піраміdalnoї форми, пониклий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабо зморшкувана.

Висота рослин 94 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 103 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся — 45,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся — 4,3 ц/га. Маса 1000 зерен 45,4 г. Вміст білка 12,7%,

® 03011005 Кобзар

Заявник: Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Власник(и): Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Пропорцевий листок: середня кількість рослин з похилим пропорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — помірний, листкова пластинка коротка та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньо виповнена із сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої довжини та щільності, вузький, циліндричної форми, напівпрямий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, середня за крупністю, видовжена, зморшкувана.

Висота рослин 91-93 см. Стійкість сорту до вилягання — 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 104-105 діб.