

антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві — дуже сильний, листкова пластинка дуже довга та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста з відсутнім або дуже слабким опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, нещільний, широкий та середньої довжини, циліндричної форми з горизонтальним положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, зморшкувата.

Висота рослин 112-125 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,4-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 285-303 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 61,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 62,4 ц/га, в зоні Полісся — 53,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 2,0 ц/га. Маса 1000 зерен 48,2-51,5 г. Вміст білка у зерні 11,9%.

Тритикале яре

® 03011009 Згурівський

Заявник: Вітвіцький Михайло Антонович

Власник(и): Вітвіцький Михайло Антонович
Приватне підприємство "Віткос"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напіврозлогий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — слабкий, листкова пластинка дуже коротка та широка. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста зі слабо опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої довжини, ширини та щільності, пірамідальної форми, пониклий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабо зморшкувата.

Висота рослин 94 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся — 45,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся — 4,3 ц/га. Маса 1000 зерен 45,4 г. Вміст білка 12,7%.

® 03011005 Кобзар

Заявник: Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Власник(и): Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — помірний, листкова пластинка коротка та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньо виповнена із сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої довжини та щільності, вузький, циліндричної форми, напівпрямий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, середня за крупністю, видовжена, зморшкувата.

Висота рослин 91-93 см. Стійкість сорту до вилягання — 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 104-105 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 46,6 ц/га, в зоні Полісся — 45,7 ц/га. Маса 1000 зерен 39,4-40,6. Вміст білка 12,1-13,2%.

® 04011006 Коровай харківський

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини середньої висоти, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабе, сизий восковий наліт на піхві — відсутній або дуже слабкий, листкова пластинка середньої довжини та ширини. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньо виповнена із сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: білий, середньої довжини, ширини та щільності, пірамідальної форми, напівпрямий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, слабо зморшувата.

Рослини висотою 101-103 см. Стійкість сорту до вилягання — 7,85-8,1 бала. Стійкість до осипання — 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи — 7,8-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103-108 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 43,4 ц/га, в зоні Лісостепу — 44,9 ц/га, в зоні Полісся — 47,0 ц/га. Маса 1000 зерен 44,3-47,1 г. Вміст білка 12,5-13,6%,

® 04011005 Лосинівське

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"
Національний аграрний університет

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини середньої висоти, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: багато рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок помірне, сизий восковий наліт на піхві — помірний, листкова пластинка середня за довжиною та шириною. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньо виповнена, з дуже сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої ширини та щільності, довгий, пірамідальної форми, напівпоникий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, дуже видовжена, зморшувата.

Висота рослин 95 см. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 41,9 ц/га, в зоні Полісся — 45,7 ц/га. Маса 1000 зерен 43,6-44,9 г. Вміст білка 12,6-12,8%,