

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 46,6 ц/га, в зоні Полісся — 45,7 ц/га. Маса 1000 зерен 39,4-40,6. Вміст білка 12,1-13,2%.

**® 04011006 Коровай харківський**

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини середньої висоти, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабе, сизий восковий наліт на піхві — відсутній або дуже слабкий, листкова пластинка середньої довжини та ширини. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньо виповнена із сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: білий, середньої довжини, ширини та щільності, пірамідальної форми, напівпрямий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, слабо зморшувата.

Рослини висотою 101-103 см. Стійкість сорту до вилягання — 7,85-8,1 бала. Стійкість до осипання — 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи — 7,8-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103-108 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 43,4 ц/га, в зоні Лісостепу — 44,9 ц/га, в зоні Полісся — 47,0 ц/га. Маса 1000 зерен 44,3-47,1 г. Вміст білка 12,5-13,6%,

**® 04011005 Лосинівське**

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"  
Національний аграрний університет

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини середньої висоти, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: багато рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок помірне, сизий восковий наліт на піхві — помірний, листкова пластинка середня за довжиною та шириною. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньо виповнена, з дуже сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої ширини та щільності, довгий, пірамідальної форми, напівпоникий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, дуже видовжена, зморшувата.

Висота рослин 95 см. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 41,9 ц/га, в зоні Полісся — 45,7 ц/га. Маса 1000 зерен 43,6-44,9 г. Вміст білка 12,6-12,8%,