

Овес ярий**03005001 Аркан**

**Заявник:** Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Рослина за габітусом пряма, середньої довжини, відсутні або дуже рідко зустрічаються рослини із закрученими пропорцевими листками, час викидання волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочек розкидиста, положення гілочек горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутністю або дуже слабкою сіруватістю. Первінне зерно: наявна помірна сіруватість нижньої квіткової луски, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первінне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -34,4 г . Середньоранній ,вегетаційний період - 97 днів .Стійкість до полягання, осипання та посухи оцінена балами - 7 -9 . Вирівняність зерна 95 % , плівчастість середня -28,6 % .

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай - 42,4 ц / га , що на 10,4 % більше стандартів .

Бактеріальним опіком , корончастою іржею уражується від слабкого до середнього .

**03005002 Декамерон**

**Заявник:** Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Рослина за габітусом пряма, середньої довжини, відсутні або дуже рідко зустрічаються рослини із закрученими пропорцевими листками, час викидання волоті – дуже ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла дуже слабка. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочек розкидиста, положення гілочек горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутністю або дуже слабкою сіруватістю. Первінне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски - відсутня, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первінне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -35,2 г . Зернівка московського / пробштейського / типу .

Середньостиглий ,вегетаційний період 95 днів . Стійкий до осипання та полягання .Посухостійкість середня .

Високоврожайний .На обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай за роки випробування 52,8 ц / га ,що на 6,8 ц / га більше стандартів . Потенційна урожайність сорту 75 ц / га .

Плівчастість 31,9 % .Білка має -13,8 % .

Бактеріальним опіком , корончастою іржею уражується слабко .Стійкий проти летуючої сажки .

**® 04005001 Самуель**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

**Власник(и):** Гроетзнер Пфланцензухт ГмбХ

Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"