

Овес ярий**03005001 Аркан**

**Заявник:** Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Рослина за габітусом пряма, середньої довжини, відсутні або дуже рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок розкидиста, положення гілочок горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутньою або дуже слабкою сіруватістю. Первинне зерно: наявна помірна сіруватість нижньої квіткової луски, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -34,4 г . Середньоранній , вегетаційний період - 97 днів . Стійкість до полягання, осипання та посухи оцінена балами - 7 -9 .  
Вирівняність зерна 95 % , плівчастість середня -28,6 % .

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай - 42,4 ц / га , що на 10,4 % більше стандартів .

Бактеріальним опіком , корончастою іржею уражується від слабого до середнього .

**03005002 Декамерон**

**Заявник:** Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Рослина за габітусом пряма, середньої довжини, відсутні або дуже рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті – дуже ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла дуже слабка. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок розкидиста, положення гілочок горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутньою або дуже слабкою сіруватістю. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски - відсутня, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -35,2 г .Зернівка московського / пробштейського / типу .

Середньостиглий , вегетаційний період 95 днів . Стійкий до осипання та полягання .Посухостійкість середня .

Високоврожайний .На обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай за роки випробування 52,8 ц / га ,що на 6,8 ц / га більше стандартів . Потенційна урожайність сорту 75 ц / га .

Плівчастість 31,9 % .Білка має -13,8 % .

Бактеріальним опіком , корончастою іржею уражується слабо . Стійкий проти летючої сажки .

**® 04005001 Самуель**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

**Власник(и):** Гроетзнер Пфланцензухт ГмбХ

Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

**Підтримувач(и):**

Рослина за габітусом пряма, довга, рослини із закрученими прапорцевими листками відсутні або дуже рідко зустрічаються, час викидання волоті – ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: довга, орієнтація гілочок одногрива, положення гілочок горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски довгі, сіруватість відсутня або дуже слабка. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня або дуже слабка, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первинне зерно: має середні базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -29,7 г .Сорт ранньостиглий , дозріває в зоні Лісостепу за 91 день , або на 3 - 6 днів раніше стандартів .Стойкий до полягання , осипання та посухи .

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,1 Ц / га .Вирівняність зерна висока , вихід крупи -100 % ,білка -14,1 % .

Слабко уражується корончастою іржею. Стойкий проти летючої сажки .

**® 04005003 Саргон**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

**Власник(и):** Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

**Підтримувач(и):**

Рослина за габітусом напівпряма, дуже довга, помірна кількість рослин із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті – середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла помірна. Волоть: коротка за довжиною, орієнтація гілочок одногрива, положення гілочок пряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із помірною сіруватістю. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски - відсутня, тенденція до остистості слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та середньої довжини стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен - 35,5 г .Зернівка московського / протштейського / типу .

Сорт середньоранній , вегетаційний період 85 - 90 днів .Стойкість проти осипання та полягання висока .

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 43 ц / га , що на 11,9 % більше стандартів , максимальний - 64 ц / га .

Слабко уражується корончастою іржею .Стойкий проти летючої сажки .

**® 04005002 Саломон**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

**Власник(и):** Гроетзнер Пфланцензухт ГмбХ

Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

**Підтримувач(и):**

Рослина за габітусом пряма, довга, рослини із закрученими прапорцевими листками відсутні або дуже рідко зустрічаються, час викидання волоті – ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: довга, орієнтація гілочок одногрива, положення гілочок пряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски довгі, сіруватість відсутня або дуже слабка. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня або дуже слабка, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первинне зерно: має середні базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -28,5 г .Сорт ранньостиглий , досягає в зоні Лісостепу за 90 днів , або на 3 -5 днів раніше стандартів .Стойкий до полягання , осипання та посухи .