

**Підтримувач(i):**

Рослина за габітусом пряма, довга, рослини із закрученими прапорцевими листками відсутні або дуже рідко зустрічаються, час викидання волоті – ранній. На найнижчих листках опущеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: довга, орієнтація гілочек одногрива, положення гілочек горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски довгі, сіруватість відсутня або дуже слабка. Первінне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня або дуже слабка, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первінне зерно: має середні базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -29,7 г .Сорт ранньостиглий , дозріває в зоні Лісостепу за 91 день , або на 3 - 6 днів раніше стандартів .Стійкий до полягання , осипання та посухи .

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,1 ц / га .Вирівняність зерна висока , вихід крупи -100 % ,білка -14,1 % .

Слабко уражується корончастою іржею. Стійкий проти летючої сажки .

**® 04005003 Саргон**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

**Власник(и):** Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

**Підтримувач(i):**

Рослина за габітусом напівпряма, дуже довга, помірна кількість рослин із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті – середній. На найнижчих листках опущеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла помірна. Волоть: коротка за довжиною, орієнтація гілочек одногрива, положення гілочек пряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із помірною сіруватістю. Первінне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски - відсутня, тенденція до остистості слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первінне зерно: має короткі базальні волоски, та середньої довжини стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен - 35,5 г .Зернівка московського / пробштейського / типу .

Сорт середньоранній , вегетаційний період 85 - 90 днів .Стійкість проти осипання та полягання висока .

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 43 ц / га , що на 11,9 % більше стандартів , максимальний - 64 ц / га .

Слабко уражується корончастою іржею .Стійкий проти летючої сажки .

**® 04005002 Саломон**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

**Власник(и):** Гроетзнер Пфланцензухт ГмбХ

Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

**Підтримувач(i):**

Рослина за габітусом пряма, довга, рослини із закрученими прапорцевими листками відсутні або дуже рідко зустрічаються, час викидання волоті – ранній. На найнижчих листках опущеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: довга, орієнтація гілочек одногрива, положення гілочек пряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски довгі, сіруватість відсутня або дуже слабка. Первінне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня або дуже слабка, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первінне зерно: має середні базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -28,5 г .Сорт ранньостиглий , достигає в зоні Лісостепу за 90 днів , або на 3 -5 днів раніше стандартів .Стійкий до полягання , осипання та посухи .

За роки випробування на обласних державних центрах отримали середній урожай 34,7 ц / га , що на рівні стандартів . Потенційна можливість сорту - 65 ц / га .

Має відмінні круп"яні якості зерна . Вирівняність зерна - 95 % , вихід крупи -100 % , смакові якості добре . Білка має 12,3 % . Корончастою іржею уражується слабко , борошнистою росою і летуючою сажкою не уражується .

### **Ячмінь озимий**

#### **® 02012011 Абориген**

**Заявник:** Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Різновидність Pallidum. Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, з похилим прапорцевим листком відсутні, або дуже мало, середньої висоти. Пррапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок наявне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос з відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини та нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка не має плівки, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє, або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкоzmоршкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 59,8 ц/га. Гарантована добавка 9,0 ц/га. Зимостійкість 8,6 балів. Вміст білку 13%. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

#### **® 03012001 Ковчег**

**Заявник:** Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Різновидність Pallidum. Тип розвитку - озимий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Пррапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок відсутнє, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос з відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткий та середньої щільності. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкоzmоршкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 63,5 ц/га. Гарантована добавка 12,7 ц/га. Зимостійкість на рівні 8,6 балів. Вміст білку 13,3%. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

#### **04012023 Морозко**

**Заявник:** Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

**Власник(и):**