

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність Pallidum. Тип розвитку - озимий. Куц напівпрямостоячий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком відсутні або дуже мало. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок відсутнє, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткий та нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та відсутній або дуже слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – довгий

Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 57,2 ц/га. Гарантована добавка 6,4 ц/га. Зимостійкість на рівні 9,0 балів. Вміст білку 12,9 ц/га. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04012024 Фантаст

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність Parallelum. Тип розвитку - озимий. Куц напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок наявне, восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, прямий, має більше двох рядів, пірамідальної форми, короткий та щільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та відсутній або дуже слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 58,9 ц/га. Гарантована добавка 8,6 ц/га. Зимостійкість на рівні 8,0 балів. Вміст білку 12,7 %. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.