

Ячмінь ярий**® 03012011 Аспект**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим пррапорцевим листком багато. Пррапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стриженъ колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястого забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 82 см. Зернівка велика, жовта. Маса 1000 зерен -47,7 г. Сорт напівінтенсивного типу. Середньопізній, у умовах Полісся дозріває за 97 днів. В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай -52,4 ц\га, що на 10,5 відсотка більше стандартів. Стійкий до полягання та осипання. Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,7%, екстрактивність речовин - 79,5%. Борошнистою росою, гельмінтоспоріозом уражується менше стандартів.

**® 04012006 Віват**

**Заявник:** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "АгроИнтер"

**Власник(и):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "АгроИнтер"

**Підтримувач(и):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "АгроИнтер"

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Кущ напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим пррапорцевим листком багато. Пррапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільний. Стриженъ колосу має середньої довжини перший сегмент та слабий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Маса 1000 зерен -49,5 г. Середньопізній, вегетаційний період 96 днів.

В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай 51,7 ц/га, що на 9,3 % більше стандартів. Потенційна урожайність сорту 85 ц/га. Сорт напівінтенсивного типу. Стійкий до полягання, осипання.

Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Пивоварний. Білка має 10,9%, екстрактивність -80%.

За даними заявителя рекомендується висівати за 100-процентної господарської придатності 4,0-4,5 млн / га насіння.

Стійкий до ураження борошнистою росою, бурою іржевою.

**® 03012015 Здобуток**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук