

Різновидність Parallelum. Тип розвитку - ярий. Куц напівпрямостоячий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком багато. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борідки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка жовта .Маса 1000 зерен -44,7 г .Середньостиглий ,вегетаційний період -89 днів .В закладах експертизи отримали середній урожай - 51,3 ц/га .що на 14,2 % більше стандартів .За даними заявника рекомендується висівати за 100 -відсоткової господарської придатності 4,5 -5 млн/га насінин .Потенційна врожайність сорту -87 ц/га .Відноситься до сортів пивоварного призначення .Білка має -11,4 % ,Плівчастість -7-8 % ,екстрактивних речовин -78-80 % .Стійкий до полягання та осипання .Борошнистою росю ,бурою іржею ,гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів .Протруєння насіння перед сівбою препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб .

® 04012007 Мальз

Заявник: Осева Ексімпо Прага с.р.о.

Власник(и): Плант Селект - товариство з обмеженою відповідальністю
Осева Ексімпо Прага с.р.о.

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Куц напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають дуже сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має довгий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борідки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 74 -75 см .Пізнюстиглий ,вегетаційний період 90 -96 днів .Насіння еліптично - видовжене , жовте .Маса 1000 зерен 45,4 -46,8 г .Сорт для інтенсивних технологій вирощування .В закладах експертизи отримали середній урожай 52,1 -54,2 ц/га , що на 14,3 -15,9 % більше стандартів . За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 -4,5 млн/га насінин .Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га .Потенційна врожайність сорту 95 ц/га .Особливістю сорту є те ,що він відрізняється підвищеною кущистістю та ранніми строками сіву .Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 10,9 -11,3 % ,плівчастість 7 -8 % ,екстрактивних речовин 80 -82 % .Борошнистою росю ,бурою іржею ,гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче стандартів .Протруєння насіння перед сівбою препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист від хвороб .

® 03012010 Незабудка

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Власник(и): Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність Parallelum. Тип розвитку - ярий. Куц напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим прапорцевим листком багато. Прапорцевий листок

- антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка еліптична, солом'яно-жовта, маса 1000 зерен -50,6 г. Пізньостиглий, вегетаційний період 100 днів. Солома середньої довжини, міцна, стійка проти полягання. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5 - 5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до недобору врожаю до 7,5 ц/га. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай -53,3 ц/га, що на 12,3 % більше стандартів. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має - 11,8 %, екстрактивних речовин -79,8 %. Стійкий до борошнистої роси, карликової іржі. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб.

® 03012007 Сонцедар

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Куц напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка ромбічної форми, світло-жовта. маса 1000 зерен 45,0-46,7 г. Середньопізній, досягає за 92 -100 днів. Стійкий до полягання, осипання. Особливістю сорту є те, що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків, високим температурам і засусі в літній період. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 -4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до значного недобору врожаю. Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 49,4- 52,9 ц/га, що на 9,8 -11,6 % більше стандартів. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,5 %, екстрактивних речовин -79 -80 %, крохмалю 58 -60 %. Стійкий до ураження борошнистою росюю.

® 03012017 Токада

Заявник: Лохов-Петкус ГмбХ

Власник(и): Лохов-Петкус ГмбХ

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Куц напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із помірним восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі