

- антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка еліптична, солом'яно-жовта, маса 1000 зерен -50,6 г. Пізньостиглий, вегетаційний період 100 днів. Солома середньої довжини, міцна, стійка проти полягання. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5 - 5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до недобору врожаю до 7,5 ц/га. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай -53,3 ц/га, що на 12,3 % більше стандартів. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має - 11,8 %, екстрактивних речовин -79,8 %. Стійкий до борошнистої роси, карликової іржі. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб.

® 03012007 Сонцедар

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Куц напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка ромбічної форми, світло-жовта. Маса 1000 зерен 45,0-46,7 г. Середньопізній, досягає за 92 -100 днів. Стійкий до полягання, осипання. Особливістю сорту є те, що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків, високим температурам і засусі в літній період. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 -4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до значного недобору врожаю. Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 49,4- 52,9 ц/га, що на 9,8 -11,6 % більше стандартів. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,5 %, екстрактивних речовин -79 -80 %, крохмалю 58 -60 %. Стійкий до ураження борошнистою росю.

® 03012017 Токада

Заявник: Лохов-Петкус ГмбХ

Власник(и): Лохов-Петкус ГмбХ

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Куц напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із помірним восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі