

форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка видовжена, світло жовта .Маса 1000 зерен 46,1 г. Середньостиглий ,вегетаційний період 85 -89 днів .Стійкий до полягання та осипання .За даними заявителя рекомендується висівати за 100 -відсоткової господарської придатності 4,5 -5 млн / га насіння .Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до недобору врожаю 4,5 -7 ц/га .Сорт напівінтенсивного типу .Добре результати дає при внесені повного мінерального живлення .На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 52,9 ц/га ,що на 17,8 % більше стандартів .Потенційна можливість сорту 90 ц/га .Відноситься до сортів пивоварного призначення .Білка має 10,2% ,екстрактивність 80,2 % ,вміст крохмалю 62,1 % .Стійкий до ураження борошнистою росою ,гельмінтоспоріозом .Агротехніка звичайна для зони вирощування .Протруєння насіння перед сівбою препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб та значне підвищення врожаю .

Кукурудза

® 04004063 Авіас 277 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіас 2000"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Зигзагоподібність стебла - відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення шовку - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне. Урожайність по зоні Степу 70,7 ц/га, Лісостепу - 97,4 ц/га, Полісся - 88,5 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,3 - 11,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,7 балів, вилягання 8,6- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-79 %. Вміст крохмалю 73,9 - 74,8%, білку 8,6 - 10,0 %.

04004090 Аванс МС 350

Заявник: Науково- виробничє фермерське господарство "Компанія "Maїс"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - малий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середні, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 71,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої

сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 %. Вміст крохмалю 73,7 %, білку 9,5 %.

03004053 Аманда

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке.

Урожайність по зоні Степу - 72,2 ц/га, Лісостепу 94,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,7 -7,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,5 балів, вилягання 8,7- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -81 %. Вміст крохмалю 73,5 - 74,6%, білку 8,8 - 9,3 %.

04004043 Буг СВ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - дуже сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки і низу зернини -оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабке.

Урожайність, ц/га по зоні Лісостепу 85,8 ц/га, гарантована прибавка складає 5,0 ц/га. Вихід зерна при обмолоті 78%. Стійкість до засухи 8,6 балів, вилягання 8,9 балів, пораження пузирчастою сажкою 9,0 балів. Вміст крохмалю 74,6%, білку 8,4% .

05004024 Бц 178

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною -