

сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 %. Вміст крохмалю 73,7 %, білку 9,5 %.

03004053 Аманда

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке.

Урожайність по зоні Степу - 72,2 ц/га, Лісостепу 94,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,7 -7,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,5 балів, вилягання 8,7- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -81 %. Вміст крохмалю 73,5 - 74,6%, білку 8,8 - 9,3 %.

04004043 Буг СВ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - дуже сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки і низу зернини -оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабке.

Урожайність, ц/га по зоні Лісостепу 85,8ц/га, гарантована прибавка складає 5,0ц/га. Вихід зерна при обмолоті 78%. Стійкість до засухи 8,6балів, вилягання 8,9 балів, пораження пузирчастою сажкою 9,0 балів. Вміст крохмалю 74,6%, білку 8,4% .

05004024 Бц 178

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною -