

сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 %. Вміст крохмалю 73,7 %, білку 9,5 %.

### **03004053 Аманда**

**Заявник:** КВС ЗААТ АГ

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке.

Урожайність по зоні Степу - 72,2 ц/га, Лісостепу 94,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,7 -7,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,5 балів, вилягання 8,7- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -81 %. Вміст крохмалю 73,5 - 74,6%, білку 8,8 - 9,3 %.

### **04004043 Буг СВ**

**Заявник:** Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - дуже сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки і низу зернини -оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабке.

Урожайність, ц/га по зоні Лісостепу 85,8 ц/га, гарантована прибавка складає 5,0 ц/га. Вихід зерна при обмолоті 78%. Стійкість до засухи 8,6 балів, вилягання 8,9 балів, пораження пузирчастою сажкою 9,0 балів. Вміст крохмалю 74,6%, білку 8,4% .

### **05004024 Бц 178**

**Заявник:** БЦ Інститут селекції і рослинництва

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною -

довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зонах Лісостепу - 89,9 ц/га, Полісся 88,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 9,1-10,0 ц/га. Стійкість до засухи по зонах становить 9,0 балів, вилягання 8,9-9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті складає 79-80%. Вміст крохмалю 73,5- 74,8%, білку 8,6-9,7%.

## **04004096 Базальт 270 ВС**

Заявник: Приватна виробнича фірма "Агроцентр"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала , головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення шовку відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 97,2 ц/га, Полісся - 88,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,6 - 11,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,9 балів, вилягання 8,4- 8,6 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 -80 %. Вміст крохмалю 72,7 - 74,4%, білку 10,2 - 10,6 %.

## **05004023 БЦ 282**

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої . Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала , головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - червоний. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке.

Урожайність по зоні Степу - 64,8 ц/га, Лісостепу -89,9 ц/га, Полісся - 90,5 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,4 - 7,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,8- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -80 %. Вміст крохмалю 73,6 - 76,7%, білку 7,7 - 9,3 %.