

довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зонах Лісостепу - 89,9 ц/га, Полісся 88,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 9,1-10,0 ц/га. Стійкість до засухи по зонах становить 9,0 балів, вилягання 8,9-9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті складає 79-80%. Вміст крохмалю 73,5- 74,8%, білку 8,6-9,7%.

04004096 Базальт 270 ВС

Заявник: Приватна виробнича фірма "Агроцентр"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала , головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення шовку відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 97,2 ц/га, Полісся - 88,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,6 - 11,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,9 балів, вилягання 8,4- 8,6 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 -80 %. Вміст крохмалю 72,7 - 74,4%, білку 10,2 - 10,6 %.

05004023 БЦ 282

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої . Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала , головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - червоний. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке.

Урожайність по зоні Степу - 64,8 ц/га, Лісостепу -89,9 ц/га, Полісся - 90,5 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,4 - 7,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,8- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -80 %. Вміст крохмалю 73,6 - 76,7%, білку 7,7 - 9,3 %.