

05004025 Бц 288 Б

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 68,5ц/га, Лісостепу -93,9 ц/га, Полісся - 87,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,4 - 8,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,8- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 81 %. Вміст крохмалю 73,6 - 75,7%, білку 8,7 - 9,3 %.

® 04004059 Бестселер 287 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Maic"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабе.

Урожайність по зоні Степу - 72,8 ц/га, Лісостепу - 89,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,6 - 6,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 - 9,0 балів, вилягання 8,8 - 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 80 %. Вміст крохмалю 76,0 - 76,2 %, білку 9,8 - 10,2 %.

® 03004028 ВЦ 380 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) -