

**05004025 Бц 288 Б**

**Заявник:** БЦ Інститут селекції і рослинництва

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 68,5 ц/га, Лісостепу - 93,9 ц/га, Полісся - 87,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,4 - 8,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,8- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 81 %. Вміст крохмалю 73,6 - 75,7%, білку 8,7 - 9,3 %.

**® 04004059 Бестселер 287 СВ**

**Заявник:** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук  
Науково-виробниче фермерське господарство "Компанія "Maїс"

**Підтримувач(і):**

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке.

Урожайність по зоні Степу - 72,8 ц/га, Лісостепу - 89,6 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,6 - 6,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 - 9,0 балів, вилягання 8,8 - 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 80 %. Вміст крохмалю 76,0 - 76,2 %, білку 9,8 - 10,2 %.

**® 03004028 ВЦ 380 МВ**

**Заявник:** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

**Підтримувач(і):**

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) -

від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластишка листка за ширину ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 74,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 %. Вміст крохмалю 76,6 білку 9,2 %.

### **04004011 Гейзер**

**Заявник:** Сінгента Сідз С.А.С.

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - малий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала , головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластишка листка за ширину ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 75,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,6 ц/га. Стійкість до засухи 9,0 балів, вилягання 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 75,2 %, білку 8,6 %.

### **03004031 Господар 360 СВ**

**Заявник:** Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть - щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластишка листка за ширину ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу на зрошені - 108,3 ц/га, на богарі - 68,5 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 %. Вміст крохмалю 74,6 білку 9,2 %.