

від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу -74,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 %. Вміст крохмалю 76,6 білку 9,2 %.

### **04004011 Гейзер**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - малий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 75,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,6 ц/га. Стійкість до засухи 9,0 балів, вилягання 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 75,2 %, білку 8,6 %.

### **03004031 Господар 360 СВ**

Заявник: Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насілля"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть - щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 108,3 ц/га, на богарі - 68,5 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 %. Вміст крохмалю 74,6 білку 9,2 %.