

® 04004056 Дерезуватський 291 СВ**Заявник:** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук**Власник(и):** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу -73,4 ц/га, Лісостепу - 89,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 9,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,6- 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 74,9 - 75,7%, білку 8,2 - 8,4 %.

03004003 ДК 243**Заявник:** Монсанта Інтернешнл Сьорл**Власник(и):****Підтримувач(и):**

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу -76,0 ц/га, Лісостепу - 91,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,2 - 8,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7- 8,9 балів, вилягання 8,8- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 75,7 - 76,6 білку 7,8 - 9,2 %.

03004051 Еміліо**Заявник:** КВС ЗААТ АГ**Власник(и):****Підтримувач(и):**

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на