

® 04004056 Дерезуватський 291 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 73,4 ц/га, Лісостепу - 89,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 9,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,7 балів, вилягання 8,6-8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 74,9 - 75,7%, білку 8,2 - 8,4 %.

03004003 ДК 243

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьюрл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу - 76,0 ц/га, Лісостепу - 91,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,2 - 8,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7-8,9 балів, вилягання 8,8-8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 75,7 - 76,6 білку 7,8 - 9,2 %.

03004051 Еміліо

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на

нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластишка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабке.

Урожайність по зоні Степу - 66,0 ц/га, Лісостепу - 98,5 ц/га, Полісся - 85,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,4 - 12,2, ц/га. Стійкість до засухи 8,7- 8,8 балів, вилягання 8,8- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 76 - 78 %. Вміст крохмалю 74,8 - 76,0%, білку 7,5 - 9,4 %.

® 04004060 Заліщицький 191 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Науково-виробничє фермерське господарство "Компанія "Maїс"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластишка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,3 ц/га, Полісся - 86,2 ц/га гарантована прибавка відповідно 7,3 - 8,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 - 8,6 балів, вилягання 8,9 - 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 80 %. Вміст крохмалю 74,6 - 75,9%, білку 8,2 - 9,8 %.

® 04004098 Колізей 180 ВС

Заявник: Приватна виробнича фірма " Агроцентр"

Власник(и): Приватна виробнича фірма " Агроцентр"
Костюченко Віктор Іванович

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластишка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу становить 86,2 ц/га, Полісся 84,6 ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 5,4-5,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,6-9,0 балів, вилягання 8,8-9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті становить 78-79%. Вміст крохмалю 74,8-76,3%, білку 7,0-9,2 %.