

04004009 КАМПАЛА

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Положення листкової пластинки листка у просторі - ледь похиле. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Положення бічних гілочок на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів - мала, колір верхівки та низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу 68,8 ц/га, Лісостепу - 91,8ц/га, Полісся - 88,2ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,4 - 6,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,6 балів, вилягання 8,6- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 77-78 %. Вміст крохмалю 74,8 - 76,0%, білку 8,3 - 10,0 %.

® 04004097 Контур 250 ВС

Заявник: Приватна виробнича фірма "Агроцентр"

Власник(и): Приватна виробнича фірма "Агроцентр"

Костюченко Віктор Іванович

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною -- середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 67,1 ц/га, Лісостепу - 90,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,7 - 5,2 ц/га. Стійкість до засухи 885- 8,9 балів, вилягання 8,5- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80, - 81 %. Вміст крохмалю 77,0 - 77,3%, білку 8,7 - 9,0 %.

04004106 КВ 2704

Заявник: Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобежиц"спулка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) -

довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,6 ц/га, Полісся - 87,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,7 - 4,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,6 балів, вилягання 8,0- 8,5 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 76,0 - 77,0 %. Вміст крохмалю 74,8 - 75,2%, білку 8,6 - 9,0 %.

04004114 Коксімо

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - дуже мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 104,9 ц/га, Лісостепу 92,6 ц/га, Полісся - 88,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,6 -14,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,5- 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 83 %. Вміст крохмалю 72,5 - 73,6%, білку 8,2 - 10,2 %.

05004010 Корнелі

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабе.

Урожайність по зоні Степу - 67,5 ц/га, Лісостепу 95,3 ц/га, Полісся - 91,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,1 -9,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,7 балів, вилягання 8,6- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 82 %. Вміст крохмалю 73,6 - 74,2%, білку 8,3 - 10,1 %.

05004014 Корсунський 297 МВ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України