

довга. Пластина листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,6 ц/га, Полісся - 87,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,7 - 4,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,6 балів, вилягання 8,0- 8,5 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 76,0 - 77,0 %. Вміст крохмалю 74,8 - 75,2%, білку 8,6 - 9,0 %.

### **04004114 Коксімо**

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек на волоті - дуже мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластина листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 104,9 ц/га, Лісостепу 92,6 ц/га, Полісся - 88,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,6 - 14,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,5- 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 83 %. Вміст крохмалю 72,5 - 73,6%, білку 8,2 - 10,2 %.

### **05004010 Корнелі**

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластина листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабке.

Урожайність по зоні Степу - 67,5 ц/га, Лісостепу 95,3 ц/га, Полісся - 91,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,1 - 9,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,7 балів, вилягання 8,6- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 82 %. Вміст крохмалю 73,6 - 74,2%, білку 8,3 - 10,1 %.

### **05004014 Корсунський 297 МВ**

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України